

مقاله پژوهشی

## اثرات متفورمین بر میزان چربیهای خون در رتهای باردار هیپرگلیسمیک و نوزادان

زیبا رجائی<sup>۱</sup>، موسی الرضا حاج زاده<sup>۲\*</sup>، آزاده نظری<sup>۳</sup>، مقدسه شمس<sup>۴</sup>

<sup>۱</sup> استادیار گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

<sup>۲</sup> استاد گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

<sup>۳</sup> کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

<sup>۴</sup> دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

\* نویسنده مسئول: دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پست الکترونیک: hajzadehmr@mums.ac.ir

وصول: ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ اصلاح: ۱۳۹۱/۱/۱۵ پذیرش: ۱۳۹۱/۱/۱۷

### چکیده

**زمینه و هدف:** دیابت حاملگی نوعی عدم تحمل به گلوکز، به هر میزان می باشد که شروع و یا تشخیص اولیه آن در دوره بارداری است. متفورمین از دسته داروهای خوراکی مورد استفاده در درمان دیابت تیپ ۲ است و در بارداری از جمله داروهای کلاس B محسوب می شود. در این مطالعه، اثر متفورمین بر میزان چربیهای خون در رت های مبتلا به دیابت بارداری و نوزادان آنها مورد بررسی قرار گرفت. **مواد و روش کار:** رت های ماده از نژاد ویستار در ۵ گروه کنترل سالم، شم، کنترل دیابتی (هیپرگلیسمی) و گروه های تجربی تحت درمان با دوزهای ۱۶۰ و ۳۰۰ mg/kg متفورمین مورد مطالعه قرار گرفتند. القاء هیپرگلیسمی مشابه دیابت بارداری با تزریق روزانه دو بار گلوکز هیپرتونیک با دوز ۴ g/kg و به دنبال آن تزریق مدروکسی پروژسترون با دوز ۳ mg/kg به صورت داخل صفاقی از روز پنجم بارداری تا پایان دوره بارداری انجام شد. گروه های تجربی از روز ۵ بارداری روزانه ۱۶۰ و ۳۰۰ mg/kg متفورمین به صورت خوراکی همراه آب مصرفی دریافت نمودند. میزان تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول HDL سرم مادران در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری و در نوزادان در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد پس از یک ناشتای ۱۴ ساعته اندازه گیری شد. **یافته ها:** پس از تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون، میزان گلوکز سرم در رت های باردار هیپرگلیسمیک نسبت به گروه کنترل بطور معنی داری افزایش یافت ( $p < 0.05$ ). مقادیر تری گلیسرید، کلسترول تام و کلسترول LDL سرم در رت های باردار هیپرگلیسمیک و نوزادان آنها نسبت به گروه کنترل بطور نسبی افزایش و مقدار کلسترول HDL کاهش یافت. درمان رت های باردار هیپرگلیسمیک با متفورمین در دوزهای ۱۶۰ و ۳۰۰ mg/kg، مقادیر تری گلیسرید، کلسترول تام و کلسترول LDL سرم مادران و نوزادان را نسبت به گروه کنترل به طور نسبی کاهش و میزان کلسترول HDL را افزایش داد که البته این تغییرات معنی دار نبود. **نتیجه گیری:** بنظر می رسد مدل رت باردار هیپرگلیسمیک مدلی قابل انطباق با دیابت بارداری در انسان است و درمان با متفورمین درمانی قابل پذیرش و بدون عارضه برای مادران مبتلا به دیابت بارداری و نوزادان آنها است.

**واژه های کلیدی:** دیابت بارداری، متفورمین، چربی، هیپرگلیسمی، نوزاد

### مقدمه

دیابت ناشی از بارداری<sup>۱</sup> (GDM)، با هرگونه اختلال در سطح گلوکز تعریف می شود که برای اولین بار در طی بارداری بروز نماید. طی بارداری، جفت و هورمونهای جفتی، فاکتورهای مقاومت به انسولین ایجاد می کنند که در سه ماهه آخر بیشتر مشهود می باشد. ارزیابی خطر دیابت در اولین مراجعه مادر باردار به پزشک پیشنهاد می گردد. خانم های در معرض خطر بالا باید فوراً غربال گیری شوند. غربالگری در خانم های در معرض خطر پایین تر تا

دیابت ناشی از بارداری<sup>۱</sup> (GDM)، با هرگونه اختلال در سطح گلوکز تعریف می شود که برای اولین بار در طی بارداری بروز نماید. طی بارداری، جفت و هورمونهای

### 1. Gestational Diabetes Mellitus

زمان ۲۸-۲۴ هفته پس از بارداری می تواند به تعویق افتد [۱]. شیوع دیابت حاملگی به موازات افزایش دیابت نوع ۲ رو به افزایش است و زنانی که در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ هستند به طور ویژه در معرض ابتلا به دیابت حاملگی قرار دارند [۲]. در کشور ما نیز در سالهای اخیر تعداد مبتلایان به دیابت حاملگی که از مراکز بهداشتی و تسهیلات زایمانی به مراکز بیمارستانی ارجاع داده می شوند به طور واضح افزایش یافته است، بویژه اینکه سن ازدواج بالا رفته و افزایش وزن و چاقی نیز در بین زنان در سن باروری رو به افزایش است [۳]. شیوع دیابت حاملگی در کشورهای مختلف به میزان ۸/۸٪ - ۲۲/۲٪ حاملگی های سالانه گزارش شده است [۴].

ریسک فاکتورهای ایجاد دیابت بارداری شامل مواردی مانند چاقی، سن بالا، فشار خون بالا [۵، ۶]، سابقه خانوادگی، باروری نامتوازن قبلی، نژاد، سندرم تخمدان پلی کیستیک، سابقه دیابت بارداری در حاملگی های قبلی، سابقه داشتن نوزاد ماکروزوم قبلی و اختلال تست تحمل قند قبل از حاملگی می باشد [۷]. اگر چه در ۹۰٪ مادران مبتلا به دیابت بارداری، پس از زایمان تست تحمل قند طبیعی می شود [۸]، اما این زنان در سالهای بعد مستعد ابتلا به دیابت نوع ۲ می باشند بطوریکه ۶۰-۱۵٪ زنان با GDM به فاصله ۵-۱۵ سال پس از زایمان دچار دیابت نوع ۲ می شوند [۹]. در یک بررسی، ۳۶٪ از زنان مبتلا به دیابت حاملگی در فاصله ۲۸-۲۲ سال پس از زایمان مبتلا به دیابت نوع ۲ شدند [۱۰].

در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه دیابت دوران بارداری با داروهای کاهنده قند خون خوراکی مثل گلی بن کلامید و متفورمین به صورت پراکنده و در تعداد نسبتاً محدود در مطالعات آینده نگر انجام شده است که در کوتاه مدت اثرات سویی را بر محصول حاملگی نشان نداده و حتی در مواردی مزیت هایی نیز داشته است. متفورمین کارآمدی بسیار خوبی در کاهش مقاومت به انسولین (افزایش حساسیت بافتی به انسولین) به ویژه در موارد مقاومت به انسولین در دیابت نوع ۲ نشان داده است [۱۱]. در پژوهش های سالهای اخیر نیز موارد امیدوارکننده ای از اثرات متفورمین در موارد دیابت بارداری گزارش شده است [۱۲، ۳]. متفورمین از جفت عبور می کند و در انسان

غلظت آن در خون بند ناف در حدود ۵۰٪ غلظت مادری است [۱۳]. لذا لازم است مطالعات بیشتری بویژه مطالعات حیوانی در مورد اثرات مصرف متفورمین در دوران بارداری بر سلامت مادر و جنین صورت گیرد تا زوایا و ابعاد بیشتری از اثرات آن شناخته شود. در این راستا، هدف از انجام این مطالعه تجربی، بررسی اثر متفورمین بر میزان چربیهای خون رتھای باردار هیپرگلیسمیک و نوزادان آنها تا یک ماه پس از تولد است. شاید درمان با متفورمین که استفاده از آن برای زنان مبتلا به GDM خوشایندتر است و هزینه کمتری نسبت به انسولین دارد و نیز عوارض انسولین را در افراد با افزایش وزن و یا زنان دچار چاقی نخواهد داشت بتواند در آینده جایگاه خود را در درمان دیابت بارداری در زنان باردار بدست آورد.

### روش کار

جهت القاء دیابت از گلوکز هیپرتونیک با دوز ۴ g/kg و به دنبال آن تزریق مدروکسی پروژسترون (که به علت اثرات ضد انسولینی و ایجاد مقاومت به انسولین سبب حفظ هیپرگلیسمی برای مدت طولانی تری می گردد) با دوز ۳mg/kg روزانه در دو نوبت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر به صورت داخل صفاقی استفاده شد [۱۴-۱۶]. جهت تایید مدل هیپرگلیسمی، ابتدا قند خون ناشتای ۱۰ حیوان باردار اندازه گیری شد و سپس به فواصل ۳ و ۲،۱ ساعت بعد از تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون، میزان قند خون حیوانات با گرفتن یک قطره خون از دم حیوان و با استفاده از گلوکومتر اندازه گیری شد.

حیوانات مورد استفاده در این مطالعه تجربی، رتھای ماده از نژاد ویستار با محدوده وزنی ۳۰±۲۰ گرم بود که در بخش حیوانات دانشکده پزشکی مشهد پرورش یافته بودند. در سراسر دوره آزمایش، حیوانات تحت شرایط استاندارد و درجه حرارت مطلوب ۲±۲۵ درجه سانتی گراد و سیکل روشنایی و تاریکی ۱۲ ساعته قرار داشتند و دسترسی آنها به آب و غذا به طور آزاد بود. سپس حیوانات بصورت تصادفی به ۵ گروه زیر دسته بندی شدند:

۱) گروه کنترل سالم (n=۷): که هیچ گونه تیماری روی آن انجام نشد.

۲) گروه شم (n=۷): رتھای بارداری که از روز پنجم بارداری تا پایان دوره بارداری، روزانه ۲ بار نرمال سالین به

همانطور که نمودار ۱ نشان می دهد غلظت تری گلیسرید سرم گروههای مختلف در روز صفر آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. در روز ۵ بارداری نیز تفاوت معنی داری بین غلظت تری گلیسرید گروههای مختلف مشاهده نشد. غلظت تری گلیسرید سرم روز ۱۵ گروه کنترل نسبت به روز ۱۵ گروه شم هیچ گونه اختلاف معنی داری نشان نداد. غلظت تری گلیسرید سرم روز ۱۵ گروه هیپرگلیسمیک نسبت به روز ۱۵ گروه کنترل به میزان ۵۰٪ افزایش داشت اما این تفاوت معنی دار نبود و غلظت تری گلیسرید سرم در گروههای تجربی ۱ و ۲ در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۶٪ و ۲۳٪ کاهش یافت اما این کاهش نیز معنی دار نبود. غلظت تری گلیسرید سرم روز ۲۰ در بین گروههای مختلف تفاوت معنی داری نداشت.

ب) غلظت کلسترول تام سرم در گروههای مختلف رتهای باردار در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری: همانگونه که در نمودار ۲ مشاهده می شود، غلظت کلسترول تام سرم در روز صفر در بین گروههای مختلف تفاوت معنی داری نداشت. در روز ۵، غلظت کلسترول تام در گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۳۴٪ افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود و در گروههای تجربی ۱ و ۲ در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی، غلظت کلسترول تام بطور جزئی کاهش یافت اما این کاهش نیز معنی دار نبود. غلظت کلسترول تام سرم در روزهای ۱۵ و ۲۰ در بین گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشت.

ج) غلظت کلسترول LDL سرم در گروههای مختلف رتهای باردار در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری: همانطور که نمودار ۳ نشان می دهد، غلظت کلسترول LDL سرم روز صفر در بین گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. در روز ۵، غلظت کلسترول LDL سرم گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۶۲٪ افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود. غلظت کلسترول LDL سرم گروههای تجربی ۱ و ۲ در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۲۴٪ و ۵٪ کاهش یافت که این کاهش نیز معنی دار نبود. در روز ۱۵ غلظت کلسترول LDL سرم در گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۵۳٪ افزایش نشان داد

صورت داخل صفاقی با حجمهای مساوی با گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون دریافت نمودند. (۳) گروه کنترل دیابتی (هیپرگلیسمی) ( $n=7$ ): رتهای باردار از روز پنجم حاملگی روزانه ۲ بار گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون به صورت داخل صفاقی تا پایان دوره بارداری دریافت نمودند.

(۴) گروه تجربی ۱ ( $n=7$ ): همانند گروه کنترل دیابتی تیمار شده و علاوه بر آن از همان روز ۵ حاملگی تا پایان دوره بارداری ۱۶۰ mg/kg/day متفورمین به صورت خوراکی همراه با آب مصرفی دریافت نمودند [۱۷-۱۹]. (۵) گروه تجربی ۲ ( $n=7$ ): همانند گروه تجربی ۱ تیمار شده و از روز ۵ حاملگی تا پایان دوره بارداری ۳۰۰ mg/kg/day متفورمین به صورت خوراکی همراه با آب مصرفی دریافت نمودند [۱۷-۱۹].

در تمامی گروهها، در روز صفر (قبل از تزریق)، ۵، ۱۵ و ۲۰ حاملگی از شبکه وریدی چشم خونگیری به عمل آمد. همینطور نمونه خون از چشم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد جمع آوری شد. سرم نمونه های خونی با سانتریفوژ به مدت ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰ در دقیقه جدا شد و نمونه های سرم تا زمان اندازه گیری تری گلیسرید، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول HDL در فریزر ۲۰- درجه نگهداری شد. مقادیر چربی با استفاده از کیت های روتین (شرکت پارس آزمون) و دستگاه فتومتر (Convergys 100) اندازه گیری شد. داده ها بصورت  $\text{Mean} \pm \text{SEM}$  بیان گردید و با استفاده از آزمونهای تی زوجی، آنالیز واریانس و تست متعاقب توکی در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ۰/۰۵  $P <$  بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.

#### یافته ها

تائید مدل هیپرگلیسمی: همانگونه که در جدول ۱ نشان داده شده است، میزان قند خون در هر سه گروه کنترل دیابتی، تجربی ۱ و تجربی ۲ در طول ۳ ساعت پس از تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون در مقایسه با ساعت صفر افزایش معنی داری یافته است.


#### بررسی بیوشیمیایی سرم رتهای باردار :

الف) غلظت تری گلیسرید سرم در گروههای مختلف رتهای باردار در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری:


جدول ۱: میزان قند خون (mg/dl) در ساعات قبل از تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون و در فواصل ۱، ۲ و ۳ ساعت بعد از تزریق آن در ۳ گروه از حیوانات باردار مورد مطالعه

| زمان                    | گروه                | کنترل           | تجربی ۱ (متفورمین ۱۶۰) | تجربی ۲ (متفورمین ۳۰۰) |
|-------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| ساعت صفر (قبل از تزریق) | دیابتی (هیپرگلیسمی) | ۱۱۲/۶ ± ۶/۹۸    | ۱۲۰/۴ ± ۴/۱۰           | ۱۲۱/۴ ± ۵/۰۴۸          |
| ساعت اول                |                     | ۲۰۵/۱ ± ۱۵/۳۰** | ۱۶۶ ± ۶/۸۵**           | ۱۶۶/۷ ± ۷/۴۱**         |
| ساعت دوم                |                     | ۱۴۷/۷ ± ۴/۸۹**  | ۱۳۲/۷ ± ۴/۶۱*          | ۱۴۲/۷ ± ۳/۱۹**         |
| ساعت سوم                |                     | ۱۳۶ ± ۳/۶۴*     | ۱۲۵/۲ ± ۲/۸۶*          | ۱۳۰/۵ ± ۳/۱۳*          |


نمایش داده ها به صورت Mean±SEM و بررسی آماری به روش Paired-Samples T-test است ( \* p<۰/۰۵ و \*\* p<۰/۰۱ در مقایسه با مقدار قبل از تزریق در هر گروه و n=۷).



**نمودار ۱:** مقایسه غلظت تری گلیسرید سرم مادران باردار گروههای مختلف در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری نمایش داده ها به صورت SEM Mean± و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها n=۷ بود



**نمودار ۲:** مقایسه غلظت کلسترول تام سرم مادران باردار گروههای مختلف در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری نمایش داده ها به صورت Mean±SEM و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروه ها n=۷ بود




**نمودار ۳:** غلظت کلسترول LDL سرم مادران باردار گروههای مختلف در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری نمایش داده ها به صورت Mean±SEM و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروه ها n=۷ بود.

معنی دار نبود و غلظت تری گلیسرید سرم نوزادان گروههای تجربی ۱ و ۲ در مقایسه با نوزادان گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۶٪ و ۲۲٪ کاهش یافت اما این کاهش ها نیز معنی دار نبود. غلظت کلسترول تام سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد: همانگونه که در نمودار ۶ مشاهده می شود بین غلظت کلسترول تام سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد تفاوت معنی داری وجود نداشت. ج) غلظت کلسترول LDL سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد: همانطور که در نمودار ۷ دیده می شود در روز ۱۵ پس از تولد غلظت کلسترول LDL سرم نوزادان گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با نوزادان گروه کنترل به میزان ۳۱٪ افزایش نشان داد اگر چه این افزایش معنی دار نبود. همچنین در نوزادان گروههای تجربی (۱ و ۲)، غلظت کلسترول LDL سرم در مقایسه با نوزادان گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۶۳٪ و ۶۷٪ کاهش یافت اما این کاهش نیز معنی دار نبود. در روز ۳۰ پس از تولد، بین غلظت کلسترول LDL سرم نوزادان گروههای مختلف، تفاوت معنی داری مشاهده نشد. د) غلظت کلسترول HDL سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد: همانگونه که نمودار ۸ نشان می دهد غلظت کلسترول HDL سرم نوزادان گروه هیپرگلیسمی در روز ۱۵ پس از تولد در مقایسه با نوزادان گروه کنترل به میزان ۳۸٪ کاهش یافت اما این کاهش معنی دار نبود. غلظت کلسترول HDL سرم نوزادان گروههای تجربی (۱ و ۲) در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۵۲٪ و ۴۸٪ و به طور معنی داری افزایش یافت ( $p < 0.05$ ). در روز ۳۰ پس از تولد، غلظت کلسترول HDL سرم نوزادان گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۱۴٪ کاهش یافت اما این کاهش معنی دار نبود. در نوزادان گروه تجربی ۱، غلظت کلسترول HDL سرم در مقایسه با نوزادان گروه هیپرگلیسمی به میزان ۳۴٪ افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود. اما غلظت کلسترول HDL سرم در نوزادان گروه تجربی ۲ در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به میزان ۵۳٪ و به طور معنی داری افزایش نشان داد ( $p < 0.05$ ).


اما این افزایش معنی دار نبود. غلظت کلسترول LDL سرم در گروه تجربی ۱ در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به طور جزئی کاهش یافت اما این کاهش نیز معنی دار نبود. در روز ۲۰، غلظت کلسترول LDL سرم در گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۳۸٪ افزایش یافت اما این افزایش معنی دار نبود و غلظت کلسترول LDL سرم در گروههای تجربی (۱ و ۲) در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب ۵۰٪ و ۵۸٪ کاهش نشان داد اما این کاهش نیز معنی دار نبود.

د) غلظت کلسترول HDL سرم در گروههای مختلف رتهای باردار در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری: همانگونه که در نمودار ۴ مشاهده می شود غلظت کلسترول HDL سرم در روزهای صفر و ۵ بارداری در بین گروه های مختلف تفاوت معنی داری نداشت. در روز ۱۵ بارداری، غلظت کلسترول HDL سرم در گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۲۸٪ کاهش نشان داد اما این کاهش معنی دار نبود. غلظت کلسترول HDL سرم در گروههای تجربی (۱ و ۲) در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۵۹٪ و ۳۴٪ کاهش یافت اما این کاهش ها نیز معنی دار نبود. در روز ۲۰ بارداری، غلظت کلسترول HDL سرم در گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با گروه کنترل به میزان ۴۴٪ کاهش داشت و در گروههای تجربی (۱ و ۲)، غلظت کلسترول HDL سرم در مقایسه با گروه هیپرگلیسمی به ترتیب به میزان ۲۸٪ و ۲۴٪ افزایش نشان داد اما این تغییرات نیز معنی دار نبود.


**بررسی بیوشیمیایی سرم نوزادان : الف) غلظت تری گلیسرید سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد:** همانطور که نمودار ۵ نشان می دهد غلظت تری گلیسرید سرم نوزادان گروه هیپرگلیسمی در مقایسه با نوزادان گروه کنترل در روز ۱۵ پس از تولد به میزان ۳۸٪ افزایش یافت و در نوزادان گروههای تجربی ۱ و ۲ در مقایسه با نوزادان گروه هیپرگلیسمی به میزان ۲۷٪ و ۱۳٪ کاهش نشان داد اما این تغییرات معنی دار نبود. غلظت تری گلیسرید سرم نوزادان گروه هیپرگلیسمی در روز ۳۰ پس از تولد در مقایسه با نوزادان گروه کنترل، به میزان ۴۲٪ افزایش یافت اما این افزایش




**نمودار ۴:** غلظت کلسترول HDL سرم مادران باردار گروههای مختلف در روزهای صفر، ۵، ۱۵ و ۲۰ بارداری نمایش داده ها به صورت Mean±SEM و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها n=۷ بود.




**نمودار ۵:** غلظت تری گلیسرید سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد نمایش داده ها به صورت SEM Mean± و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها n=۵ بود.



**نمودار ۶:** غلظت کلسترول تام سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد نمایش داده ها به صورت  $\text{Mean} \pm \text{SEM}$  و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها  $n=5$  بود



**نمودار ۷:** غلظت کلسترول LDL سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد نمایش داده ها به صورت  $\text{Mean} \pm \text{SEM}$  و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها  $n=5$  بود



نمودار ۸: غلظت کلسترول HDL سرم نوزادان گروههای مختلف در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد نمایش داده ها به صورت Mean± SEM و بررسی آماری به روش one-way ANOVA و تست تعقیبی Tukey انجام شد و در هر یک از گروهها n=۵ بود، \*p<۰/۰۵.

## بحث

نتایج مطالعه حاضر حاکی از این است که با تزریق گلوکز هیپرتونیک و مدروکسی پروژسترون به رت‌های بارداری، قند خون در طول سه ساعت پس از تزریق افزایش می‌یابد. این مدل با تزریق روزانه دو بار گلوکز و مدروکسی پروژسترون می‌تواند قند خون رت بارداری را در حدود ۶-۸ ساعت در روز، در سطح هیپرگلیسمی و بالاتر از حد نرمال نگه دارد که حالتی شبیه دیابت بارداری است.

برای تشخیص قطعی دیابت بارداری علاوه بر توجه به قند خون ناشتا به عنوان یک معیار در تشخیص، آزمایش GCT<sup>۱</sup> و به طور دقیق اندازه گیری با روش OGTT<sup>۲</sup> انجام می‌شود. در مطالعه ای که توسط IAOD<sup>۳</sup> و PSG<sup>۴</sup> در سال ۲۰۱۰ انجام گرفت، سطح آستانه OGTT برای GDM یک ساعت پس از خوردن ۷۵ گرم گلوکز ۹۱mg/dl و ۲ ساعت پس از خوردن ۷۵ گرم گلوکز ۱۵۰mg/dl مشخص شد [۲۰].

در پژوهشی که توسط ملیحه مقدمی در سال ۸۸ با عنوان "بررسی اثر هیپرگلیسمی حاد ملایم و مکرر بر ساختار هیپوکامپ و تشنج پذیری ناشی از پنتیلن تترازول در رت" انجام گرفت، هیپرگلیسمی در حیوانات تجربی با تزریق ۲ g/kg گلوکز هیپرتونیک به صورت داخل صفاقی

ایجاد گردید و در زمانهای صفر، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه پس از تزریق، غلظت گلوکز خون در گروه هیپرگلیسمی به ترتیب ۱۳۴/۴۳، ۱۵۱/۶۳، ۲۱۶/۴۲، ۱۳۶/۲۶ [۱۶]. یافته های ما نیز در تایید نتایج پژوهش این محقق نشان می‌دهد که با تزریق گلوکز هیپرتونیک می‌توان به طور کوتاه مدت سطح قند خون را در رت‌های بارداری افزایش داد. در پژوهش دیگری که توسط حسین دینی در سال ۸۰ تحت عنوان "مقایسه اثر آمینون (یک مهار کننده انتخابی PDE) و IBMX (یک مهار کننده غیر انتخابی PDE) بر ترشح انسولین و قند خون در موش سوری" انجام گرفت، ۳ دوز ۸، ۴ و ۲ g/kg گلوکز هیپرتونیک به صورت داخل صفاقی تزریق شد و میزان قند خون، در سه زمان ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه اندازه گیری شد و دوز مناسب جهت انجام پژوهش ۴ g/kg انتخاب گردید. یافته های ما در پژوهش حاضر بیشتر با یافته های دینی و همکاران هماهنگ است و می‌توان این روش را در رت، مدلی قابل قبول برای دیابت بارداری تلقی نمود [۲۱].

در پژوهش حاضر غلظت کلسترول تام و کلسترول LDL سرم رت‌های بارداری هیپرگلیسمیک در طی بارداری نسبت به گروه کنترل به مقدار جزئی افزایش و غلظت کلسترول HDL کاهش یافت. بنظر می‌رسد این تغییرات جزئی به علت افزایش نسبی و موقت قند خون و یا به دلیل کوتاهی دوران بارداری در رت باشد. همچنین نتایج نشان داد

1. Glucose Challenge Test
2. Oral glucose tolerance test
3. International Association of Diabetes
4. Pregnancy Study Groups

تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی خون از جمله کلسترول و اختلالات ناشی از آن در کوتاه مدت مدل مناسبی است و می توان این مدل را در مطالعات برای بررسی GDM و عوارض آن در تعمیم به موارد انسانی به کار برد.

طبق نتایج این مطالعه، هیپرگلیسمی مادران در دوران بارداری موجب افزایش جزئی تری گلیسرید سرم نسبت به گروه کنترل گردید و مصرف متفورمین نیز با دو دوز مصرفی اثر جزئی در کاهش تری گلیسرید مادران باردار داشت. احتمالاً هیپرگلیسمی نسبی در مادران باردار و کوتاهی دوران بارداری در رت دلایل عمده ای باشند که افزایش سطح تری گلیسرید را موجب نمی شوند.

میزان تری گلیسرید سرم در بین نوزادان گروههای مختلف که در دو روز ۱۵ و ۳۰ پس از تولد اندازه گیری شد تفاوت معنی داری نداشت. بنابراین، این مدل از هیپرگلیسمی دوران بارداری اثری بر تری گلیسرید زاده ها ندارد و از طرف دیگر، عدم تاثیر متفورمین بر تری گلیسرید سرم نوزادان را نشان می دهد و مؤید آن است که تجویز متفورمین در دوره بارداری در مادران حداقل اثر بر سطح تری گلیسرید نوزادان آنها در فاصله یک ماهه از تولد به وجود آورده است. لذا متفورمین می تواند به راحتی و بدون دغدغه ایجاد تغییرات در تری گلیسرید و سایر چربیهای خون در فرزندان مادران حامله با GDM مصرف شود. اگر چه تغییرات در سطوح قند، کلسترول و تری گلیسرید در رت های باردار هیپرگلیسمیک نسبی است اما همین تغییرات نسبی می تواند زمینه ساز اختلالات متابولیکی و برخی از عوارض گردد که در دوران بارداری برای مادر و جنین و پس از تولد برای نوزادان و حتی در اوایل جوانی برای فرزند اختلالات و مشکلاتی را بوجود آورد. در مطالعه ای که در فنلاند به صورت آینده نگر توسط راوی و همکاران<sup>۳</sup> انجام شد، زنان مبتلا به GDM در ۳ گروه تحت درمان با متفورمین، انسولین و بدون درمان قرار گرفتند، یافته ها تفاوتی بین گروه متفورمین و دو گروه دیگر از نظر متوسط وزن نوزاد، زمان تولد و شیوع ماکروزومی نشان نداد [۲۴]. در مطالعه ای که توسط دی فرونزو و همکاران<sup>۴</sup> در سال ۱۹۹۵ تحت عنوان "اثرات

غلظت کلسترول تام و کلسترول LDL سرم در رت های باردار تحت درمان با متفورمین نسبت به گروه هیپرگلیسمی به طور جزئی و غیر معنی داری کاهش و غلظت HDL در روز ۲۰ بارداری افزایش یافت. در مطالعه ای که توسط روشیو و همکاران<sup>۱</sup> در سال ۲۰۰۵ بر روی ۳۵ زن باردار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که ۶ ماه تحت درمان با متفورمین بودند انجام گرفت نتایج نشان داد که متفورمین سطح کلسترول HDL سرم را افزایش و سطح کلسترول تام و تری گلیسرید سرم را نیز به طور معنی داری کاهش داد و موجب کاهش ریسک بیماریهای قلبی نیز گردید [۲۲].

در مجموع با توجه به اینکه در این مطالعه تغییرات غلظت کلسترول در رت های باردار هیپرگلیسمیک جزئی است، به نظر می رسد که در این شرایط افزایش جزئی و کوتاه مدت قند دوران بارداری عامل مهمی برای تغییرات غلظت کلسترول پلاسما و افزایش آن که موجب افزایش ریسک بیماریهای قلبی عروقی گردد نمی باشد. تجویز متفورمین نیز اثرات سویی بر میزان کلسترول پلاسما ندارد و حتی به طور نسبی آنرا کاهش می دهد.

نتایج مطالعه حاضر همچنین نشان داد که تغییرات میزان کلسترول در نوزادان مادران هیپرگلیسمیک در روزهای ۱۵ و ۳۰ پس از تولد در مقایسه با نوزادان زاده شده از مادران گروه کنترل تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد که می تواند ناشی از عدم تاثیر هیپرگلیسمی نسبی، که در این مدل مطالعه در حیوانات به وجود آمده است، بر میزان کلسترول باشد. در مطالعه ای که توسط گلوک<sup>۲</sup> و همکاران در سال ۲۰۰۱ انجام گرفت نیز از ۷۲ زن که در طی بارداری متفورمین مصرف می کردند و در آنها از ۸۴ جنین، ۶۳ تولد زنده طبیعی و بدون نقص مادرزادی متولد شد، هیچ گونه اختلالی در میزان کلسترول تام، کلسترول HDL، کلسترول LDL و تری گلیسرید سرم مادران و نوزادان آنها وجود نداشت [۲۳]. یافته های ما در پژوهش حاضر نیز موید نتایج این محققین است و بنظر می رسد که مدل رت باردار هیپرگلیسمیک برای بررسی

1. Rautio
2. Glueck

3. Ravi
4. DeFronzo Ralf et al

### نتیجه گیری

با توجه به اینکه هیپرگلیسمی ایجاد شده در این مطالعه یک هیپرگلیسمی نسبی است، تغییرات ایجاد شده در فاکتورهای بیوشیمیایی مورد مطالعه نیز جزئی است و درمان با متفورمین نیز کاهش جزئی در سطح آنها ایجاد کرده و بدنبال آن کمترین تغییرات را در سطح فاکتورهای مورد بررسی در نوزادان به همراه داشته است. در مجموع بنظر می رسد مدل رت باردار هیپر گلیسمیک مدلی قابل انطباق با دیابت بارداری در انسان است و درمان با متفورمین درمانی قابل پذیرش و بدون عارضه برای مادران مبتلا به دیابت حاملگی و نوزادان آنها است.

### تشکر و قدردانی

نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جهت حمایت مالی پژوهش حاضر اعلام می دارند.

متفورمین در بیماران با دیابت غیر وابسته به انسولین<sup>۱</sup> انجام گرفت، از دو پروتکل درمانی (۱) تحت درمان با متفورمین به تنهایی در مقایسه با گروه پلاسبو (۲) تحت درمان با متفورمین و گلی بوراید در مقایسه با متفورمین به تنهایی و گلی بوراید به تنهایی استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر دو پروتکل درمانی در بیمارانی که متفورمین مصرف کردند به طور معنی داری سطح کلسترول تام و تری گلیسرید بیماران کاهش یافت. همچنین نشان داده شد که افزایش چربیهای خون به خصوص هیپرتری گلیسریدمی در دیابت بارداری با تجویز متفورمین بهبود یافت. در مطالعه بایلی و دگوگو<sup>۱</sup> نیز کاهش در سطح تری گلیسرید نشان داده شد [۲۵-۲۷]. در مطالعه ای که توسط گلوک و همکاران در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت هیچ گونه اختلالی در میزان تری گلیسرید سرم مادران و نوزادان آنها وجود نداشت [۲۸]. در مطالعه دیگری که توسط همین محققین بر روی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که در دوران حاملگی متفورمین مصرف می کردند انجام شد، هیچ نوع اثرات سویی از متفورمین بر جنین مشاهده نگردید. در این مطالعه که فرزندان مادران دیابتی درمان شده با متفورمین از بدو تولد تا ۱۸ ماهگی مطالعه شدند در وزن، قد، رشد و تکامل، اعمال حرکتی و رفتارهای اجتماعی هیچگونه اختلالی را نشان ندادند [۲۸]. در مطالعه دیگری که توسط روون<sup>۲</sup> و همکاران جهت بررسی اثرات متفورمین طراحی و اجرا شد، ۷۵۱ زن مبتلا به دیابت بارداری به طور تصادفی در دو گروه با مصرف انسولین و با مصرف متفورمین مطالعه شدند، در پایان مطالعه نتایج اولیه در هر دو گروه تفاوتی نداشت و هیچگونه عوارض نامناسبی در نوزادان مادران دیابتی که متفورمین مصرف می کردند دیده نشد و در گروه متفورمین تعداد بیشتری از زنان از نحوه درمان خود رضایت داشتند [۲۹]. نتایج مطالعه ما نیز در تایید مطالعات فوق نشان می دهد که متفورمین یک داروی قابل پذیرش و بی ضرر در درمان دیابت حاملگی است و در کنترل چربیهای خون در رتهای باردار هیپرگلیسمیک موثر است.

1. Bailey & Dagogo.

2. Rowan

## References

1. Harrison TR, Principles of Internal Medicine, Tehran, 1991.
2. Cheung NW, The management of gestational diabetes, Vasc Health Risk Manag 2009; 5(1):153-64.
3. Khosh-Niat Niko M, Abaszadeh Ahranjani SH, Larijani B, Prevalence of Gestational Diabetes in Iran, Iran J Diab Lipid 2008; 8(1):1-10.
4. Zhao J, Weiler HA, Long-term effects of gestational diabetes on offspring health are more pronounced in skeletal growth than body composition and glucose tolerance, B J Nutr 2010; 104(11):1641-9.
5. Moore TR, Fetal exposure to gestational diabetes contributes to subsequent adult metabolic syndrome, Am J Obstet Gynecol 2010; 202(6):643-9.
6. Hedderston MM, Ferrara A, High blood pressure before and during early pregnancy is associated with an increased risk of gestational diabetes mellitus, Diabetes Care 2008;31(12):2362-7.
7. Langer O, Mazze R, The relationship between large-for-gestational age infant and glycemic control in women with gestational diabetes, Am J Obstet Gynecol 1988; 159(6):1478-83.
8. Hod M, Merlob P, Friedman, S, "et al", Gestational diabetes mellitus: a survey of perinatal complications in the 1980s, Diabetes 1991; 40(2):74-8.
9. Ecker JL, Greenberg, JA, Norwitz ER, "et al", Birth Weight as a predictor of brachial plexus injury, Obstet Gynecol 1997;89:643-7.
10. Jang H, Cho N, Min Y, Han I, Jung K, Metzger B, Increased macrosomia and perinatal morbidity independent of maternal obesity and advanced age in Korean women with GDM, Diabetes Care, 1997;20(10):1582-8.
11. Kjos S, Buchanan T, Greenspoon J, Montoro M, Bernstein G, Mestman J, Gestational diabetes mellitus: the prevalence of glucose intolerance and diabetes mellitus in the first two months post partum, Am J Obstet Gynecol 1990;163:93-8.
12. Hughes R, Rowan J, Pregnancy in women with Type 2 diabetes: who takes metformin and what is the outcome? Diabet Med 2006; 23(3):318-22.
13. Kapoor N, Sankaran S, Hyer S, Shehata H, Diabetes in pregnancy: a review of current evidence, Curr Opin Obstet Gynecol 2007; 19(6):586-90.
14. Leis D, Bottermann P, Ermler R, Henderkott U, Glück H, The influence of high doses of oral medroxyprogesterone acetate on glucose tolerance, serum insulin levels and adrenal response to ACTH A study of 17 patients under treatment for endometrial cancer, Obstet Gynecol 1980; 230(1):9-13.
15. Spellacy W, McLeod A, Buhi W, Birk S, McCreary S, Medroxyprogesterone acetate and carbohydrate metabolism: measurement of glucose, insulin, and growth hormone during 6 months' time, Fertil Steril 1970;21(6):457.
16. Moghadami M, Study of Effect of repeated mild acute hyperglycemia of structure of hippocampus and PTZ induced seizures in rat, Ferdowsi university of mashhad faculty of Sciences Department of Biology, September 2009[persian].
17. Verma S, Effect of metformin treatment on isolated cardiac function and blood pressure in diabetic and hypertensive rats, University of British Columbia 1993.
18. Verma S, Bhanot S, McNeill JH, Antihypertensive effects of metformin in fructose-fed hyperinsulinemic, hypertensive rats, Pharmacol Exp Ther 1994; 271(3):1334-1337.
19. Kim YW, Kim JY, Park YH, Park SY, Won KC, Choi KH, Huh JY, Moon KH Metformin restores leptin sensitivity in high-fat-fed obese rats with leptin resistance, Diabetes 2006 Mar;55(3) 716-724.
20. The International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy, Diabetes care 2010; 33:676-82.
21. Dinni H, Comparing The Effects of Amrinon, Aselective PDE3 inhibitor and IBMX, A non-Selective PDE inhibitor on Insulin Secretion and plasma glucose concentration in mouse, Mashhad university of Medical sciences, school of pharmacy 2001.
22. Rautio K, Tapanainen J, Ruokonen A, Morin-Papunen L, Effects of metformin and ethinyl estradiol-cyproterone acetate on lipid levels in obese and non-obese women with polycystic ovary syndrome, Eur J Endocrinol 2005;152(2):269-75.
23. Glueck C, Phillips H, Cameron D, Sieve-Smith L, Wang P, Continuing metformin throughout pregnancy in women with polycystic ovary syndrome appears to safely reduce first-trimester spontaneous abortion: a pilot study, Fertil Steril. 2001;75(1):46-52.

24. Ravi K, Rajasekaran S, Subramanian S, Antihyperlipidemic effect of *Eugenia jambolana* seed kernel on streptozotocin-induced diabetes in rats, *Food Chem Toxicol* 2005; 43(9):1433-9.
25. DeFronzo RA, Goodman AM, Efficacy of metformin in patients with non-insulin-dependent diabetes mellitus, *N Engl J Med* 1995;333(9):541-9.
26. Bailey C, Turner RC, Drug therapy: metformin, *N Engl J Med* 1996;334(9):574-9.
27. Dagogo-Jack S, Santiago JV, Pathophysiology of type 2 diabetes and modes of action of therapeutic interventions, *Arch Intern Med* 1997;157(16):1802.
28. Glueck C, Wang P, Kobayashi S, Phillips H, Sieve-Smith L, Metformin therapy throughout pregnancy reduces the development of gestational diabetes in women with polycystic ovary syndrome, *Fertil Steril* 2002;77(3):520-5.
29. Rowan JA, Hague WM, Gao W, Battin MR, Moore MP, Metformin versus insulin for the treatment of gestational diabetes, *N Engl J Med* 2008;358(19):2003-15.

## Original Article

## The effect of metformin on serum lipid levels in hyperglycemic pregnant rats and their newborns

Rajaei Z<sup>1</sup>, Hadjzadeh MR<sup>2\*</sup>, Nazari A<sup>3</sup>, Shams M<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Assistant Professor of Physiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

<sup>2</sup> Professor of Physiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

<sup>3</sup> M.Sc of Physiology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

<sup>4</sup> Student of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.

**\*Corresponding Author:**  
Department of Physiology,  
School of Medicine, Mashhad  
University of Medical Sciences,  
Mashhad, Iran.  
E-mail: hajzadehmr@mums.ac.ir

### Abstract

**Background & Objectives:** Gestational diabetes is an state of glucose intolerance that is diagnosed during pregnancy. Metformin is a biguanide oral hypoglycemic agent and is used in treatment of type 2 diabetes mellitus, but its use in treatment of gestational diabetes has been controversial. The purpose of the present study was to investigate the effects of metformin on serum lipid profile in hyperglycemic pregnant rats and their progenies.

**Materials & Methods:** Female Wistar rats were randomly divided into 5 groups: intact control, sham, hyperglycemic and 2 experimental groups treated with metformin at doses of 160 and 300 mg/kg. The hyperglycemia was induced by the intraperitoneal injection of hypertonic glucose (4g/kg) and medroxyprogesterone (3mg/kg) twice daily since the 5th day of pregnancy through the end of the gestational period. Furthermore, experimental groups received 160 and 300 mg/kg metformin in drinking water since 5th day of gestation through the end of the pregnancy. The maternal blood samples were taken on days 0, 5, 15 and 20 of pregnancy, while neonatal samples were collected on postnatal days of 15 and 30. Biochemical factors (triglyceride, total cholesterol, LDL-cholesterol and HDL-cholesterol) were measured spectrophotometrically by routine laboratory techniques.

**Results:** Following injection of hypertonic glucose and medroxyprogesterone, serum glucose levels were significantly increased in hyperglycemic pregnant rats compared to control. Serum triglyceride and cholesterol levels in hyperglycemic pregnant rats and their newborns were partially increased in comparison to control group. Treatment of hyperglycemic pregnant rats with metformin at dosages of 160 and 300 mg/kg decreased the lipid levels in the mothers and their newborns compared to hyperglycemic group, although the changes were not significant.

**Conclusion:** Our findings suggest that the hyperglycemic pregnant rat model is a reliable model for gestational diabetes in human. Metformin is a safe and effective treatment for rat dams during gestational diabetes and their progenies. Therefore, it may be suggested that metformin can be used in treatment of gestational diabetes in pregnant women.

**Keywords:** Gestational diabetes, Metformin, Hyperglycemia, Lipid, Newborns, Rat.

**Submitted:** 2012 Feb 7

**Revised:** 2012 Apr 3

**Accepted:** 2012 Apr 5