

مقاله پژوهش

آیا کمبود مصرف آب علت اصلی سنگهای ادراری در برخی از مناطق ایران با ذخایر آبهای سنگین می باشد؟

*عبدالله رازی^۱، آرمان بهرد^۲

^۱ متخصص اورولوژی، بیمارستان امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۲ دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

پست الکترونیک: Arman.behi@gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: آب سنگین به عنوان یک ریسک فاکتور مهم جهت ایجاد سنگهای ادراری در مناطقی از ایران که دارای آب سنگین می باشد، مطرح شده است. هدف از مطالعه تشخیص علت اصلی سنگ سازی در ناحیه شاهروд که دارای ذخایر آب سنگین می باشد است.

مواد و روش کار: علت سنگ سازی در یکصد بیمار مراجعه کننده با سنگهای ادراری در شهرستان شاهروド مورد مطالعه قرار گرفت. از کلیه بیماران شرح حال و معاینه لازم بعمل آمد و آزمایش جنس سنگ، آزمایش خون از نظر کامل خون، کراتینین، کلسیم، فسفات، اورات و نیز آزمایش ساده ادرار با دقت بر عفونت، PH، کریستال و سیستئین به عمل آمد. در افراد با سابقه خانوادگی سنگ، سابقه سنگ قبلی و سنگ های متعدد، آزمایش ادرار ۲۴ ساعته از نظر فاکتورهای خطر سنگ سازی انجام شد.

یافته ها: مصرف کم آب که با حجم ادرار ۲۴ ساعته کمتر از ۲ لیتر تعریف می شد، در ۱۱ بیمار (۱۱٪) ملاحظه گردید. سطح پایین سیترات در ۳۲ بیمار (۳۲٪) وجود داشت. در ۱۱ بیمار (۱۱٪) سایر علل سنگ سازی از جمله هیپرکلسیوری مشاهده گردید.

نتیجه گیری: مصرف کم آب و سطح پایین سیترات علل اصلی سنگ سازی در منطقه شاهرود می باشند. آب سنگین و هیپرکلسیوری ناشی از آن نقش قابل توجهی در این میان ندارد.

واژه های کلیدی: آب سنگین، سنگهای ادراری، سیترات، هیپرکلسیوری

روش کار

علت سنگ سازی در یکصد بیمار مراجعه کننده با سنگهای ادراری در شهرستان شاهروود مورد مطالعه قرار گرفت. جمع آوری اطلاعات از طریف پرسشنامه انجام شد. پر کردن پرسشنامه توسط پزشک و به صورت مصاحبه چهره به چهره انجام شد. در پرسشنامه سوالات بسته به صورت بلی - خیر در مورد عادات تغذیه ای و میزان نوشیدن آب، سابقه بیماری و داروهای مصرفی مطرح شد. در کلیه بیماران آنالیز سنگ، آزمایش خون از نظر کامل خون، کراتینین، پتاسیم، کلسیم، فسفات و اورات، آزمایش

مقدمه

شیوع سنگهای ادراری در طول زندگی فرد ۱۵-۱٪ می باشد و عوامل مختلفی مثل سن و جنس و منطقه جغرافیایی بر این میزان تاثیر می گذارد [۱]. آب سنگین به عنوان یکی از علل اصلی سنگ سازی در مناطق مختلفی از ایران مطرح شده است. شاهرود یکی از مناطقی است مه دارای ذخایر آب سنگین می باشد و همانگونه که ذکر شد آب سنگین به عنوان علت اصلی سنگ سازی در میان مردم منطقه شناخته شده است. هدف از این مطالعه تعیین علت اصلی سنگ سازی در این منطقه از ایران بود.

وسيع مشخص شد که مصرف مایعات و ريسک بروز سنگهای ادراری با هم ارتباط مستقيم دارند.^[۱,۴] همچين در يك مطالعه گذشته نگر بر روی تاثير مصرف آب در عود سنگ در افرادي که برای اولين بار سنگهای کلسيمي داشتند مشاهده شد که حجم ادرار در افرادي که مایعات بيشتری مصرف می کردند بالاتر بود و عود سنگهای ادراری پايین تر بود. تفاوتهاي جغرافياي در بروز سنگهای ادراري در موادری مرتبط با تفاوت در محتوى الكلتروليتي و معدنی آب آن مناطق می باشد schwarts. و همکارانش هيج گونه ارتباطي بین سختی آب و ميزان بروز اپی زود های سنگ نيافتند. اگرچه ارتباطی بین سختی آب و سطح منيزيم، کلسيم و سيترات ادراري گزارش کرددند.^[۱].

در ارزياي افرادي که برای اولين بار دچار سنگهای ادراري شده اند، اولين قدم شرح حال است. در شرح حال حتماً باید در مورد بيماريهاي که با بروز سنگهای ادراري مرتبط هستند سوال بشود. مثلاً يك شرح حال دقیق در مورد وضعیت اجابت مزاج و کارکرد روده ای باید گرفته شود. سابقه نقرس که ممکن است پیش زمینه ای برای هيپراوريکوزوری باشد اهمیت دارد. وجود دیابت ملیتوس نیز در این بیماران نیز منهم است. به علاوه حتمتً باید در مورد عادات غذایي ای مشتمل بر مصرف مایعات، غذاها و مصرف داروها نیز سوال شود.^[۶,۷,۸,۹]

همچين در مورد دسترسی به آب کافي و نیز شغل اين افراد نیز باید سوال بشود. وجود سابقه فاميلي نیز می تواند دليلی بر وجود يك علت ژنتيکی برای سنگهای ادراري باشد.^[۱۰] در اين بیماران آزمایشات اوليه عبارتند از: يك آزمایش خون مشتمل بر برسی سدیم، پتاسیم، کلراید در اکسید کربن، کراتینین و اوره، کلسيم و هورمون پاراتیروئید [۱] برسی نمونه ادرار از نظر PH و کريستال های سیستئين اهمیت دارد. کشت ادرار از نظر عفونت های ناشی از ارگانیسم های تجزیه کننده اوره از مثل کلبسیلا اهمیت دارد.^[۱۲]

بررسی رادیولوژيک از قبيل گرافی ساده شکم، پیلو گرافی داخل وریدی و CT در تشخيص سنگ و ناهنجارهای سیستم ادراري مفید هستند.

ادرار ساده از نظر گلبول های سفید، PH، باکتری و سیستئین و تعیین کريستالهای سیستئین، استروویت و اورات انجام شد. در افراد با سابقه خانوادگی سنگ، سابقه قبلی سنگ، سنگهای متعدد، نفروکلیستوز، عفونت های ادراري طولاني مدت، بيماري یا جراحی گوارشي، بيماري استخوانی و یا نقرس داشتند، مطالعه وسيع به صورت بررسی علل آناتوميك با سونوگرافی و در صورت اختلال در سونوگرافی انجام IVP و بررسی عناصر ادرار ۲۴ ساعته شامل حجم، کلسيم، اگزالات، فسفات، سيترات، اورات، سیستئين، پتاسیم، كلر، منیزیم، اوره، کراتینین و حجم ادرار ۲۴ ساعته کمتر از ۲ لیتر، هيپرکلیسیوری، به کلسيم ادراري بيش از ۳۰۰ میلی گرم در مردان و ۷۵۰ میلی گرم در ادرار ۲۴ ساعته و سیستئين اوری هموزیگوت به سیستئين بيش از ۲۵۰ میلی گرم/ گرم کراتینین اطلاق گردید.^[۱]

يافته ها

صرف کم آب در ۸۱٪ بیماران ملاحظه شد. سطح پایین سیترات در ۳۲ بیمار (۳۲٪) وجو داشت و در ۱۱ بیمار (۱۱٪) سایر علل سنگ سازی از جمله هيپرکلیسیوری مشاهده گردید. هيپرکلیسیوری مشاهده گردید. هيپرکلیسیوری در ۹ بیمار (۹٪) و هيپراوريکوزوری در ۲ بیمار (۲٪) مشاهده گردید. تنگی حالت تحتانی ثابت شده با IVP در ۲ بیمار وجود داشت.

بحث

شیوع سنگهای ادراري در طول زندگی فرد ۱۵-۱٪ است و عوامل مختلفی مثل سن و جنس و منطقه جغرافيايی بر این ميزان تاثير دارند. شیوع بالاي سنگهای ادراري در مناطق گرم و با آب و هوای خشک مثل کوهستان ، صحراء یا مناطق استوائي وجود دارد. شیوع سنگهای ادراري با تغيير فصل تغيير می کند که علت آن احتمالاً افزایش دفع آب طی تعریق و گرما می باشد.^[۱۲] در مشاغلی که تماس با گرما و هیدراتاسیون رخ می دهد شیوع سنگهای ادراري بیشتر است. مثلاً آشپزها و افرادي که در تماس با موتورهای بخار هستند در معرض حرارت بالا می باشند [۱,۳] فواید مصرف زياد مایعات در پیشگیری از سنگ های ادراري از گذشته شناخته شده بود. در دو مطالعه

ادرار ۲۴ ساعته جزئی از این بررسی است. مطالعه ما نشان داد که در منطقه شاهروド که بیماران سنگ سازی خود را وابسته به ذخایر آب سنگین می دانند و لذا توصیه به مصرف کمتر آب منطقه دارند، آب سنگین و در نتیجه هیپرکلسیوری ناشی از آن نقش مهمی در ایجاد سنگ سازی مردم منطقه ندارد و مصرف کم آب و کمبود سیترات ادراری دو علت اصلی سنگ سازی می باشد.

نتیجه گیری

آب سنگین و در نتیجه هیپرکلسیوری ناشی از آن نقش مهمی در سنگ سازی مردم منطقه شاهرود ندارد و مصرف کم آب و هیپوسیتراتوری علت اصلی سنگ سازی مردم آن منطقه می باشد.

References

1. Paul K P, Glenn M P, Evaluation and medical management of urinary lithiasis,campbell-walsh urology,2007; vol 2:1393-1430.
2. Embon O M, Rose G A, Posenbamn T: chronic dehydration stone disease. Br j urol .1990 oct;66(4):357-62.
3. Borgi L, Meschi T, Amato F, "et al": urinary volume, water and recurrences in idiopathic calcium nephrolithiasis: a 5 years randomized prospective study .j urol 1996; 155: 839-843.
4. Siener R, Hesse A : fluid intake and epidemiology of urolithiasis, Eur j clin Nutr.2003 Des ;57suppl 2 :547-51.
5. Borgi L, meschi T, Schianchi T,"et al" :urine volume :stone risk factor and preventive measure nephron 1999;81(suppl 1):31-37.
6. Holms R P,Assimos D G:the impact of dietary oxalate on kidney stone formation, Urol Res 2004;32:311-316.
7. Curan G C,willett T,Rimm E B,stampfer M J:A prospec tive study of dietary calcium and

در افرادی که دچار عود سنگ ادراری هستند، سابقه فامیلی برای سنگ سازی دارند، بیماری های روده مخصوصاً اسهال مزمن، سیستم اسکلتی پاتولوژیک، استئوپروز، سابقه عفونت های سیستم های ادراری همراه سنگ، سابقه نقرس و تک کلیه ها، اختلالات آناتومیک، نارسایی کلیوی و افرادی که دچار سنگهای سیستینی، اوریک اسیدی و یا استرورویتی هستند بررسی متابولیک وسیع انجام می شود. بررسی وسیع عبارتست از، آزمایش کامل خون، هورمون پاراتیروئید، بررسی کلسیم و اوریک اسید و سدیم، پتاسیم، کلراید در اکسید کربن، کراتینین و اوره در خون می باشد. همچنین بررسی کراتینین، سدیم، PH، حجم کلی، اگزالت، سیترات [۱۳] و سیستئین در

other nutrients and the risk of symptomatic kidney stones, N Engl j med 19;328:833_838.
 8. Siener R,Hesse A:The effect of vegetarian and different omnivorous diet on urinary risk factors for uric acid stone formation ,Eur j vutr.2003 Des ;42(6):332-7.
 9. Power C,Barker DJ,Nelson M,Winter PD: Diet and renal stone :A case control study,Br jurol,1984 oct ;56(5):446-9.
 10.Levy FL,Adams-Huet B,Pack CY: ambulatory evaluation of nephrolithiasis :an update of a 1980 protocol, Amj med 1995;98:50-59.
 11.Adel-Halim RE: urolithiasis in adults, clinical and biochemical aspects, saudi med j 2005 May;26(5):705-13.
 12.Griffith DP,Osborn CA: infection(urease)stones, miner electrolyte Metab 1987;13:278-285.
 13.Pack CY: citrate and renal calculi: an update ,miner electrolyte Metab 1994;20:371-377.p

Original Article

Low intake of water is the main cause of urinary stone forming in Iran areas that have reserves of heavy water

Razi A¹, Behrad A^{2}*

¹ Urologist, Emam Ali hospital, north khorasan university of medical science, Bojnurd, , Iran

² medical student, north khorasan university of medical science, Bojnurd, Iran

***Coresponding Author:** North khorasan university of medical science, Bojnurd, Iran
Email:Arman.behi@gmail.com

Abstract

Introduction:Heavy water (high solute concentration water) has been proposed as important risk factor in areas that have reserves of heavy water. The aim of this study is to determine the main cause of stone forming in Shahrod area, which is of heavy water reserved.

Material and methods

100 patients with urinary stone in Shahrod city were studied. History and physical exam, stone component test, blood test of complete blood count, calcium, phosphate, urate and simple urine test accurately infection, ph, crystal, and cystine were examined in all patients. 24 hour urine test in order to determine risk factors of stone forming were performed in individuals with a history of stone their family, previous stone or multiple stone.

Results:Low water intake that defined as less than 2liters urination in 24hour observed in 81 patients (81%).Low level of citrate were found in 32 patients (32%).In 11 patients (11%) other causes of stone forming like hypercalciuria were observed.

Conclusion:Low water intake and low level of citrate in normal diet of Shahrod city people are the main cause of stone forming in people of this area.Heavy water and hypercalciuria had no significant role in stone forming in this area.

Key Words:Heavy Water,urinary stone, citrate, hypercalciuria
