

مقاله پژوهشی

میزان کفایت دیالیز و برخی عوامل بیوشمیابی مرتبط با آن در بیماران همودیالیز بیمارستان امام علی (ع) شهر بجنورد

* میترا هاشمی^۱، افسانه گرشاد^۲

^۱ کارشناس ارشد آمار، معاونت پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۲ کارشناس ارشد پرستاری، مری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

نویسنده مسئول: بجنورد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پست الکترونیک: garshadafsaneh12@gmail.com

وصول: ۱۳۹۱/۸/۱۱ اصلاح: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۲/۲۱

چکیده

زمینه و هدف: همودیالیز رایج ترین روش درمان جایگزین کلیه در ایران است. با انجام همودیالیز کافی و موثر می‌توان کیفیت زندگی بیمار را بهبود بخشید. عدم کفایت دیالیز، باعث بروز عوارض متعدد اورمی در بیمار می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی امام شد.

مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی ۶۳ بیمار تحت همودیالیز دائم مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) بجنورد که سابقه حداقل ۳ ماه و بیش از یکبار دیالیز در هفته داشتند بررسی و اطلاعات دموگرافیک، زمان شروع دیالیز، مدت دیالیز در هر جلسه، دفعات دیالیز، وزن، نوع داروهای مصرفی، فشار خون، سرعت پمپ و نوع صافی جمع آوری شدند. سطح هموگلوبین و هماتوکریت و کلسترول و آلبومین سطح BUN (نیتروژن اوره خون) بالاصله قبل از شروع همودیالیز و نیز بعد از خاتمه دیالیز اندازه گیری شد. سپس کفایت دیالیز بیماران با استفاده از فرمول Daugirddas II محاسبه شد. جهت تعیین اهداف مطالعه، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 و آزمون‌های مجذور کاری، تی مستقل و زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد، سطح معنی داری در این مطالعه ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران مورد مطالعه ۱۶ ± ۴/۸ سال بود. ۴۷/۵٪ (۲۹ نفر) دارای ضرب ۱/۲ <kt/v> و نیز ۳۶/۱٪ (۲۲ نفر) داشتند. کفایت دیالیز در زنان بطور قابل توجهی بالاتر از مردان بود. میانگین فشار خون، وزن و BUN بعد از انجام دیالیز در افراد با ۱/۲ <URR> و ۰/۷ <kt/v> کاهش نشان داد.

نتیجه گیری: کفایت دیالیز در این مرکز نسبت به برخی مطالعات جهانی و مطالعات داخلی کشور سطح پایین تری داشت. مطالعات بیشتری برای دست یافتن به علل پایین بودن کفایت دیالیز در این مرکز ضروری می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: همودیالیز، کفایت دیالیز، مرحله آخر بیماری کلیه

مقدمه

نارسایی مزمن کلیوی در ابتداء تحت درمان محافظتی قرار می‌گیرند ولی سرانجام نیاز به همودیالیز پیدا می‌کنند [۱]. در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در جهان از طریق دیالیز به حیات خود ادامه می‌دهند [۲]. اما با وجود پیشرفت در مراقبت‌های پزشکی و دیالیز این بیماران، میزان مرگ و میر در بیماران به طور غیر قابل انتظاری بالاست [۳]. عدم کفایت دیالیز یکی از اصلی امروزه بیماری‌های مزمن شیوع روز افزون یافته است از آن جمله مرحله آخر بیماری کلیه (ESRD) که تنها در ایالات متحده اکنون به طور تخمینی چهارصد هزار نفر مبتلا وجود دارد. بروز کلی ESRD، ۲۶۰ مورد در هر یک میلیون نفر جمعیت در سال است و هر ساله به طور تقریبی ۶ درصد افزایش می‌یابد [۴]. افراد مبتلا به

همکاران به نقل از لن^۳ و همکاران نشان دادند که بعد از گذشت یک سال، بیمارانی که اسید اوریک پایین داشتند کمتر در بیمارستان بستری شدند در صورتی که اسید اوریک بالا پس از دیالیز باعث افزایش دفعات بستری بوده است همچنین وقتی بیمار ناکافی دیالیز شود عوارض رخ می دهد که ممکن است بعدها با دیالیز قابل رفع نباشد[۱۲]. منفرد و همکاران نشان دادند که مرگ و میر بیماران رابطه مستقیم با زمان دیالیز دارد طبق این گزارش مرگ و میر در بیماران دیالیزی که در هفته اول کمتر از ۱۰/۵ ساعت دیالیز می شوند به مراتب زیادتر از بیمارانی بود که هر هفته بیش از ۱۲ ساعت تحت دیالیز بودند [۱۴]. اینگ^۴ و همکاران نیز در مطالعه ای روی بیمار دیالیزی نشان دادند که 7 kt/v بیماران به طور متوسط بین ۱/۲ تا ۱/۴ می باشد[۱۵]. افزایش ۷ درصدی مرگ و میر به ازای ۰/۱ افزایش 7 kt/v ۱۱ درصدی مرگ و میر به ازای هر ۵ درصد URR گزارش شده است [۱۶]. بنابراین مدل کینتیک اوره با سه متغیر مهم در ارتباط است که در افت محتوی اوره خون طی عمل دیالیز نقش دارند و به نفرولوژیست و تیم دیالیز اجازه می دهد تا فرآیند دیالیز را به اجزای متخلکه آن تفکیک نموده، دیالیز را به طور کمی ارزیابی کند[۸]. همچنین در مطالعات متعدد یک رابطه قوی بین میزان دیالیز انجام شده و نتایج کلینیکی نشان داده شده است [۱۷]. 7 kt/v بالا یکی از مهم ترین اهداف همودیالیز بوده، به طور کامل در پیش آگهی بیماران دیالیزی موثر است [۱۸]. در نتیجه می باشد عوامل موثر بر آن تحت کنترل و نظارت دقیق قرار گیردد[۱۳، ۱۰]. از طرفی با انجام یک دیالیز صحیح و حساب شده می توان از بسیاری از عوارض پیش گیری نمود و با جلوگیری از بستری های مکرر، ضمن اعمال صرفه جویی در هزینه های درمانی، کیفیت زندگی بهتری را برای بیماران فراهم نمود[۱۴]. مطالعه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیز انجام شده برای بیماران همودیالیزی بیمارستان امام علی (ع) بجنورد صورت گرفت.

روش کار

در این مطالعه توصیفی مقطعی، ۶۳ بیمار همودیالیزی که ۳ ماه از شروع دیالیز آنها می گذشت و بیش از ۱ بار در

ترین عوامل مرگ و میر در بیماران مبتلا به ESRD می باشد[۵،۶]. شناخت از کفایت دیالیز هنوز کامل نیست. اندازه گیری و پایش سریال BUN کافی به نظر نمی رسد، زیرا مقادیر پایین آن بیش از آن که نشان دهنده برداشت کافی اوره متوسط توسط دیالیز باشد، نشان دهنده وضعیت نامطلوب تغذیه است. تلاش هایی برای تعیین کفایت دیالیز از سال ۱۹۵۱ آغاز و در این راستا الگوی کینتیک اوره به کار گرفته شده است. با این الگو می توان مقدار واقعی دوز موثر را با استفاده از مقدار دوز دیالیز تجویز شده تعیین کرد به منظور بررسی کفایت دیالیز از نسبت کاهش اوره URR و SPktv_{URR} استفاده می شود که SPktv معیار بهتری به شمار می رود. SPktv یک نسبت بدون واحد است که نشان دهنده حجم پلاسمای پاک شده تقسیم بر حجم توزیع اوره می باشد[۷]. (K_v یا کلیرانس اوره، T_v یا مدت زمان دیالیز و V حجم توزیع اوره بدن) که می توان کارایی دیالیز را مورد سنجش قرار داده، در صورت نیاز بهبود بخشید [۸]. SPktv بر اساس الگوی کینتیک اوره، در ابتدای حداقل معادل ۱/۰۵ ابرای کفایت دیالیز در نظر گرفته شد[۷] از سال ۱۹۹۳ که رهنمودهای RPA که حداقل URR برای $>1/2$ و $<1/2$ SPktv را برای کفایت دیالیز تعیین کردند، پیشرفت آشکاری در انجام دیالیز کافی در تمام بیماران با نارسایی پیشرفت کلیه (ESRD) مشاهده شده است که رهنمودهای DOQI/NKF نیز در سال ۱۹۹۷ در این مقادیر را توصیه کرده است البته بر اساس معیارهای NKF/DOQI در سال ۲۰۰۶ هدف 7 kt/v در تمام مطالعه می باشد و 7 kt/v بیشتر از $1/2$ قبل محسوب می شود [۹] انجمن مطالعه ملی کلیه آمریکا (NCDS) بررسی دوره ای کفایت دیالیز ا توصیه نموده خط راهنمای کفایت دیالیز 7 kt/v را بیشتر یا مساوی $1/2$ بیان می کند [۱۰]. کواکیک^۱ و همکاران نشان دادند که برای بیمارانی که $5/5$ ساعت دیالیز شده اند مقدار متوسط URR درصد بوده است. با این حال، علیرغم این پیشرفت های چشمگیر، ۱۱ درصد بیماران حداقل استانداردهای کفایت دیالیز را کسب نمی کنند. که ۵۵ درصد آنها ناشی از تجویز ناکافی دیالیز می باشد[۱۱]. جفری فبنگ و

و زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

یافته ها

میانگین سن بیماران 48 ± 16 سال بود. 58% (۳۷ نفر) مرد $41/3$ ٪ (۲۶ نفر) زن بودند. نسبت جنسیتی مردان و زنان یکسان بود. $90/2$ ٪ (۵۵ نفر) از افراد مورد مطالعه سابقه دیالیز در بستگان درجه اول را نداشتند، هیچ یک از افراد مبتلا به HIV نبودند، فقط $12/7$ درصد (۸ نفر) از بیماران دارای هپاتیت بودند. که ۵ نفر آنها دارای هپاتیت C و ۳ نفر دارای هپاتیت B بودند. $6/5$ ٪ (۴ نفر) تحت پیوند کلیه قرار داشتند و $47/6$ ٪ (۳۰ نفر) سابقه فشار خون و $20/6$ ٪ (۱۳ نفر) دارای بیماری دیابت و $7/9$ ٪ (۵ نفر) سابقه ابتلا به بیماری پلی کیستیک و $4/8$ ٪ (۳ نفر) مشکلات ارولوژی و $12/7$ ٪ (۸ نفر) بیماری گلومرونفیریت را ذکر نمودند. $66/7$ ٪ (۴۲ نفر) ۳ بار در هفته مورد دیالیز قرار گرفتند و مدت دیالیز هر جلسه $26/2$ ٪ (۴۸ نفر) ۴ ساعت در هفته بود. در $90/3$ ٪ (۵۶ نفر) افراد مورد بررسی راه دستیابی به عروق فیستول و $4/8$ ٪ (۳ نفر) گرفت بود و برای $57/1$ ٪ (۳۶ نفر) افراد مورد مطالعه نوع صافی که برای آنها استفاده می شد $ps10$ ، $ps13$ ، $ps3/3$ ٪ (۲۱ نفر) بود. میانگین فشار خون، وزن و BUN افراد مورد مطالعه بعد از انجام دیالیز کاهش نشان داد ($p < 0.001$). (جدول ۱).

$URR > 65$ ٪ (۳۶/۱) افراد مورد مطالعه دارای $URR > 65$ و $URR > 1/2$ بودند در این مطالعه با افزایش URR ، میزان kt/v نیز افزایش یافت ($p < 0.001$). (جدول ۲) افراد مورد مطالعه از داروی کربنات کلسیم و ضد کم خونی، $63/5$ ٪ (۴۰ نفر) پایین آورنده فشار خون، $7/9$ ٪ (۵ نفر) ضد دیابت، $9/5$ ٪ (۶ نفر) آرام بخش، $17/5$ ٪ (۱۱ نفر) آنتی اسید، $1/6$ ٪ (۱ نفر) ضد تیروئید و 19 ٪ (۱۲ نفر) آلبومین استفاده می کردند و هیچ یک از داروهای ضد افسردگی استفاده نمی کردند.

میانگین $URR > 65$ در بین افراد با تعداد دفعات دیالیز دو، سه و سایر تفاوت معنی داری نشان نداد، در گروهی که سه بار در هفته دیالیز می شدند $12/7$ ٪ (۱۹ نفر) $URR > 65$ و 16 نفر $URR > 65$ ، اما میانگین آلبومین، هموگلوبین و هماتوکریت بین زنان و مردان اختلاف معنای داری داشت ($p = 0.04$). (جدول ۲)، اما میانگین آلبومین، هموگلوبین و هماتوکریت

هفته دیالیز می شدند انتخاب شدند. بیماران اورژانس و نیز بیماران مهمان از مطالعه حذف شدند. ابتدا به بیماران اطلاعات لازم در مورد نحوه انجام آزمایشات و عدم پیامدهای سوء احتمالی ارائه شد و رضایت آگاهانه جهت شرکت در مطالعه از آن ها اخذ گردید سپس بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، طول مدت دیالیز هر جلسه، تعداد دفعات دیالیز در هفته، طول مدت درمان با همودیالیز و دور پمپ خون دستگاه به روش مصاحبه تکمیل گردید. اطلاعاتی که توسط بخش دوم پرسشنامه جمع آوری گردید عبارت بود از وزن و فشارخون قبل از شروع و پس از اتمام جلسه دیالیز و آزمایشات کلسترول، آلبومین، هموگلوبین و هماتوکریت و اوره خون که قبل از روش نمودن پمپ خون دستگاه اندازه گیری شد. برای نمونه اوره خون بعد از دیالیز، نمونه گیری در پایان جلسه دیالیز ظرف یک دقیقه پس از کاهش سرعت جریان خون تا 50 میلی لیتر در دقیقه از خون برگشتی از بیمار گرفته شد. آزمایش اوره خون با استفاده از کیت پارس آزمون دستگاهی توسط تکنسین مسلط انجام شد. بدین صورت که پس از جدا سازی سرم از لخته، آن را به مدت 15 دقیقه در حرارت 37 درجه سانتیگراد نگهداری نموده، سپس در عرض 20 دقیقه توسط دستگاه با کیت مذکور مورد سنجش قرار گرفت. این مطالعه بر روی افراد یکسان برای نمونه گیری خون، کیت پارس آزمون با پرسنل یکنواخت، ترازوی ایستاده عقره ای تست شده با وزنه یک کیلوگرمی و لباس بیمارستان و بدون کفش صورت گرفت دستگاه دیالیز از نوع فرزینوس بود. برای تعیین کفایت دیالیز مقادیر kt/v و URR برای هر جلسه دیالیز بیماران گردید. طبق فرمول تعیین

$$\frac{KT}{V} = In = \left(\frac{0}{008} \times t \right) + (403/5R) + UF/V$$

$$URR = 100 \times (1 - \frac{\text{اوره قبل از دیالیز}}{\text{اوره بعد از دیالیز}})$$

برای گزارش کفایت دیالیز URR در محدوده 65 ٪ و $1/2$ در محدود kt/v یا بیشتر در نظر گرفته شد. داده ها توسط نرم افزار نرم افزار SPSS15 و بر حسب تناسب از روشهای آمار توصیفی، آزمون کای دو، آزمون تی مستقل

افرادی که $kt/v < 1/2$ بیشتر از افرادی بود که $kt/v > 1/2$ داشتند اما میانگین HB, HCT کراتنین و آلبومین در بین افراد با $URR < 65$ و $URR > 65$ و $kt/v < 1/2$ تفاوت معنی داری نداشت، میانگین BUN قبل از دیالیز در افراد با $URR < 65$ و $URR > 65$ و افراد بعد از انجام دیالیز در افراد با $URR < 65$ و $URR > 65$ کاهش نشان داد.

ارتباط معنی داری بین URR و وزن بیماران وجود داشت. $URR < 0.5$ و بیماران با جثه بزرگتر از دیالیز کمتری برخوردار بودند. بین kt/v و جنس افراد مورد مطالعه ارتباط وجود داشت ($78/1\%$ نفر) افرادی که $kt/v < 1/2$ داشتند مرد بودند، میانگین سرعت پمپ بین افراد با $kt/v < 1/2$ تفاوتی نشان نداد. میانگین کلسترول در $kt/v < 1/2$

جدول ۱: میانگین فشار خون، وزن و BUN قبل و بعد از انجام دیالیز

BUN	وزن	فشار خون	
$118 \pm 34/9$	$62/5 \pm 16$	135 ± 25	قبل از دیالیز
$46/6 \pm 15/8$	$60/2 \pm 16$	122 ± 26	بعد از دیالیز
$p < 0.001$	$p < 0.001$	$p < 0.001$	سطح معنی داری

جدول ۲: محاسبه میانگین و انحراف معیار URR و KT/V در بیماران مورد مطالعه

معیار	میانگین	انحراف	حداقل	حداکثر	تعداد دفعات در هفته	معیارهای کفایت
						دیالیز
۸۵	۷	$16/9$	۶۰/۵۳	دو بار		URR
۸۷	۲۱	$13/87$	۶۰/۶۳	سه بار		
۶۶	۵۹	۵	۶۲/۵	سایر		
۲/۳۷	۰/۶۷	$0/37$	۱/۲۷	دو بار		KT/V
۲/۱۵	۰/۳۳	$0/41$	۱/۰۸	سه بار		
۱/۳	۱/۰۵	$0/18$	۱/۱۸	سایر		

بحث

انجام شد، همچنین ۹۰٪ از بیماران در مطالعه دیگری در مرکز همودیالیز کاشان (۱۳۸۰) که بر روی ۳۷ بیمار انجام گرفت، ۸۰٪ بیماران در مرکز همودیالیز کردستان (۱۳۸۰) ۵۸٪ از بیماران در مرکز همودیالیز ساری (۱۳۸۲) کمتر از $1/2$ داشتند [۲۰-۲۲] بر اساس گزارش CPM در سال ۲۰۰۲، ۹۱٪ بیماران همودیالیزی با طول مدت دیالیز بیشتر از ۶ ماه kt/v بیشتر از $1/2$ را کسب کرده اند که صرف نظر از طول مدت دیالیز این رقم

نتایج این مطالعه نشان داد که ۳۶٪ افراد مورد مطالعه $URR < 65$ و $47/5\%$ داشتند این در حالی است که در کشور ما در طی مطالعه ای در مرکز دیالیز اهواز (سال ۱۳۸۷) ۸۶٪ بیمارانی که ۳ بار در هفته دیالیز شده بودند و ۹۷٪ از بیمارانی که ۲ بار در هفته دیالیز شده بودند $URR < 1/2$ داشتند [۱۹]. در مطالعه ای که در مرکز همودیالیز همدان (۱۳۸۲) بر روی ۱۰۰ بیمار

این موارد بعنوان محدودیت های بژوهش اشاره نمود که بهتر است به ارتباط هریک از این متغیرات با کفايت دیالیز در بژوهش های بعدی بپردازیم.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه و با توجه به افزایش روز افزون بیماری های مزمن از قبیل دیابت و پرفشاری خون در نتیجه افزایش بیماران همودیالیزی و کمبود ماشین های دیالیز و پرسنل مجرب ضروری است که با مداخلات درمانی و بررسی عوامل مداخله گر در کفايت دیالیز و در نتیجه اقدامات لازم برای بهبود کیفیت دیالیز صورت گیرد تا دیالیز بیماران کفايت لازم را داشته باشد و از صرف هزینه های درمانی بیشتر جلوگیری گردد و در نهایت باعث افزایش کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی گردد.

تشکر و قدردانی

این طرح بژوهشی با کد ۳۹۶/۰/۹۰ در جلسه بژوهشی مورخه ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ و جلسه شورای اخلاق ۱۳۹۱/۰۵/۸ به تصویب رسیده است. نویسنده‌گان مقاله مراتب سپاس و تشکر خود را از سرکار خانم معصومه ترابی مسئول محترم مرکز همودیالیز بیمارستان امام علی (ع) و سرکار خانم گلبهار نامداری از پرسنل بخش دیالیز بیمارستان به دلیل همکاری ارزنده در جمع آوری اطلاعات اعلام می‌نمایند.

References

- 1-Harrison TR,Kasper DL.Harrison's principles of internal medicine .16th ed.New yourk:MC Graw-Hill,2005.
- 2-Vipond -c M.Intervention strategies for Dialysis and Vimprove restriction compliance in chronic hemodialysis patient .transplantation.1991 apr;20(40):166-8
- 3-Hakim RM,Depner TA,Parkker Tf,III.Adequacy of hemodialysis.Am j kidney Dis 1992;20(2):107-23.
- 4-Chauveau p,Nguyen h,combe c,chene g,azar r,cano n,etal.dialyzer membrane permeability and survival hn hemodialysis patients. Am j kidney dis 2005;45(3):565-71.
- 5-Acchiardo sr ,Hatten kw,Ruvinsky mj ,dyson b,fuller j,moore lw.inadequate dialysis increase gross mortality rate.asao j 1992;38(3):m 282-m285.
- 6-Held pj,port fk,wolfe ra ,stannard dc, carroll ce,daugirds jt,etal.the close of

۱۹۹۶٪ است که از سال ۲۰۰۰ به میزان ۳٪ و از سال ۱۹۹۶ به میزان ۱۵٪ افزایش داشته است [۲۲]. این مطالعات و همچنین مطالعه حاضر نشان می دهد که کفايت دیالیز در کشور ما بسیار نامطلوب می باشد مضاف بر این که این مطالعات در مراکز دانشگاهی انجام شده است که انتظار مطالعات در مراکز بیمارستانی بیشتری بر میزان دیالیز بیماران وجود داشته باشد. در این مطالعه میانگین BUN بعد از دیالیز در افراد با $URR < 65$ و در افراد با $URR < 65$ و $kt/v < 1/2$ تفاوت داشت و مقدار آن در افراد با $URR < 65$ و $kt/v > 1/2$ کاهش نشان داد که مطابق با مطالعه تازیکی [۲۴] و مطالعات بزرگ NCDS و دیگر مطالعات بود[۲۵,۲۶]. اما میانگین HB,HCT کراتنین و آلومین در بین افراد با $URR < 65$ و $URR < 65$ و $kt/v > 1/2$ تفاوت معنی داری نشان نداد، این ارتباط در مطالعه ای که در بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) در بیمارستان ساری [۲۴] و مطالعه ای که در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران [۲۶] و شهرستان شاهروド [۲۷] انجام شد نیز دیده نشده است در صورتی که در تعدادی از مطالعات دیگر این ارتباط ذکر شده است [۲۵,۲۶,۲۷] این مطالعه نشان داد کفايت دیالیز در بین زنان بطور قابل توجهی بالاتر از مردان بود که علت اصلی آن تجویز بهتر دیالیز در زنان احتمالاً به علت استفاده از صافی مشابه با مردان در صورتیکه جثه زنان نسبت به مردان کوچکتر است، می باشد که با سایر مطالعات مطابقت دارد [۲۴,۲۸,۲۹,۳۰] به نظر می رسد تجویز ناکافی دیالیز، به کارگیری صافی نامناسب، کم بودن دور پمپ (سرعت گردش خون) و کم بودن زمان یا دفعات دیالیز از علل عدم کفايت دیالیز باشند گل ببابی (۱۳۸۱) می نویسد: علل شایع ناکافی بودن دیالیز، کم تر بودن دیالیز به علت اشتباہ در محاسبات، به کارگیری صافی نامناسب (کوچک)، کم تر بودن k واقعی صافی نسبت به آن چه کارخانه ادعا کرده است، کم بودن سرعت گردش خون به دلیل عدم کارایی فیستول با عدم تحمل بیمار، کم بودن زمان دیالیز به علت عدم تحمل یا عدم همکاری بیمار، قطع کردن یا کم کردن سرعت دیالیز به دلیل عوارض حین دیالیز مانند: افت فشار خون، کرامپ عضلانی یا آنژین صدری و نهایتاً عدم کفايت دسترسی عروق تعییه نامناسب سوزن های فیستول است [۳۱]. که می توان به

- the dialysis dose.comput methods programs biomed 2004;74(2):109-28.
- 19-Shahbazian H.Poorvays z.Study on the adequacy of hemodialysis in Sina Hospital.scien med J AHWAZ un MedScien 1381;33:25-19.
- 20-Nadi E,Bashirian S,Khosravi M.Assessing of dialysis adequacy in patients under hemodialysis in dialysis department of Ekbatan Hospital in Hamadan .Scien Hamadan un Med Scien Health serv 1382;29(10):33-27.
- 21-Lesan pezeshki M,Matini M,Taghadosi M,Moosavi SGA.Valuation of the sufficiency of dialysis in patients with renal disease in Kashan from 1997to1998 feyz.Kashan un Med Scien health serv 1380;17(5):87-82.
- 22-Delavari AR,Sharifian A,Rahimi E.Dialysis sufficiency in three dialysis centers in Kurdistan province.Scientific Journal of Kurdistan university of Medical Sciences 1380;20(5):22-18.
- 23-Centers for Medicare and Medicaid services.2002Annual report ESRD clinical performance Measure project.Department of Health and Human services.Centers for Medicare and Medicaid services .Centers for Beneficiary choices.BaHimore,2007.
- 24-Tazeki ,o,Kashi Z.Assessing on the adequacy of hemodialysis I Fatemeh Zahra Hospital in Sari;1379.
- 25-NKF-DOA Ichinical practice Guidelines for hemodialysis adequacy national kidney foundation .AMJ kid dis 1997 sep(30):515.
- 26-Owen WF,low N:URR and Serum Albumin as predictor of Mortality in patients undergoing hemodialysis.N Engl J Med:1993;329:1001.
- 27-Hossien Ebrahimi &etal.Relationship between the Dose of Erythropoietin and the Dialysis Adequacy .Knowledge&Health ;2008;3(2):7-12.
- 28-Owen WF JR.Dose of hemodialysis and survival difference by race and sex.JMA 1998;280:1764-1768.
- 29-Wolfe RA.Body size dose of hemodialysis and mortality.AM J kid dis 2000;35:80-88.
- 30-Hanson J A prescription of twice weekly hemodialysis in the USA.AMJ Nephrol 1999;19:625-633.
- 31-Golbabai M.Dialysis administration and optimal dialysis ward circumstances .Iranian medical university symposium on special disease.No2002.
- hemodialysis and patient mortality.kidney int 1996;50(2):550-6.
- 7-Gotch ,fa ,sergeant ,ja.a mechanistic analysis of the national cooperative dialysis study cncds .int 1985;28:526.
- 8-Daugirds jt,blake pg,ing ts.Hand book of dialysis .2nd ed.phildelphia:Lippincott Williams&wilkins;2001.p.14-45.
- 9-K/DOQi clinical practice Guidelines and clinical practice recommendation 2006 updates hemodialysis adequacy peritoneal dialysis adequacy vascular access.Am j kidney dis 2006;48 suppl (1):510.
- 10-Hemodialysis dose and adequacy.national kidney and urologic diseases information clearinghouse (on line).2005;Available form:url:www.kidney.niddk.nih.gov/
- 11-Kovacic v,sain m,D zanko D.Effect of gender and body mass on hemodialysis dose.acta med croatica 2003;57(1):33-70.
- 12-2004 annual report :ESRT clinical performance measure project .Am j kidney dis suppl 2005;46:525.
- 13-Leon jb,sehgal ar.identifying patients at risk for hemodialysis underprescription .am j nephrol 2001;21(3):200-7.
- 14-Monfared A,orang pour R,Kohani M.Evalution of hemodialysis adequacy on patients undergoing hemodialysis in razi hospital in rasht .journal of guilan university of medical sciences 2008;17(65):44,(in persian).
- 15-ING T,Cheng y,Shek c,wong k,yang v,Kjellstrand c,etal.observation on urea kinetic modeling and adequacy of hemodialysis. Hong kong journalof nephrology 2010;2(1):3-12.
- 16-Curtis jj.Treatment of irreversible renal failure ,dialysis.in:Fayette cecil rl,Bennett jc,plum f,editors. Cecil text book of medicine .philadelphia:saunder,1996.p:563-68.
- 17-Leonard MB,stablein DM,ho m,jabs k,Feldman Hi.racial and center differences in hemodialysis adequacy in children treated at pediatric centers:a north American pediatric renal transplantation cooperative study (NAPRTCS) report.J amsoc Nephrol 2004;15(11):2923-32.
- 18-Prado M,Roal L,Palma A,Milan JA.ANovel Mathematical Method based on urea Kinetic modeling for computing

Original Article

Assissting the Adequacy of Dialysis and some biochemical Factors related to it in patient under Heamodialysis in Dialysis ward of Emam Ali Hospital Of Bojnourd

Hashemi M¹, Garshad A^{2}*

¹M.Sc of Statistics, Deputy of Research, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

²M.Sc of Nursing, Faculty member of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

***Corresponding Author:**

School of Nursing and Midwifery, North Khorasan University of Medical Sciences,Bojnurd, Iran

Email:

garshadafsaneh12@gmail.com

Abstract

Background &objective: Heamodialysis is one of the most common replacement treatment of renal transplantation. Effective and adequate heamodialysis could improve the quality of life of patients. Inadequate heamodialysis can lead to multiple uremic complications. The aim of this study was to determine dialysis adequacy of hemodialytic patients based on urea kinetic modeling in hemodialysis center in Bojnourd.

Materials&Methods: This descriptive study was carried out on 63 patients who were under dialysis treatment (at least 3 month and once a week) in Imam Ali hospital,Bojnurd. Hemoglobin , hematocrit ,cholesterol and BUN were measured before and after heamodialysis. Adequacy of dialysis was calculated by Daugirddas II. Data were analyzed by SPSS software 15 and presented with chi square, independent a paired t-test, ANOVA.

Results: Our results showed that %36.1 of individuals have URR>65% and %47.7 individuals have KT/V >1.2. After dialysis mean blood pressure,weight,BUN showed meaningful reduction. There was a significant difference between mean of BUN post dialysis and KT/V and URR. There wasn't significant between KT/V URR and Hb Hct,Alt,cratinen,Chlostrol.

Conclusion: According to this study the adequacy of dialysis in patients was lower than those of same reported studies .we suggest more study in order to determine the underlying reasons for dialysis inadequacy in these patients.

Keywords: Dialysis Adequacy.Hemodialysis,KT/V

Submitted: 1 Nov 2012

Revised: 4 Mar 2013

Accepted: 11 Mar 2013