

گزارش مورد

گزارش یک مورد بیمار HIV مثبت با تظاهر واکوئولار میلوپاتی (Vacuolar myelopathy)

مجید غفوری^{۱*}، سیاوش درخشان^۲، معصومه رحیمی^۳

^۱استادیار، بیماریهای عفونی و گرمیبری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۲استادیار، بیماریهای مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۳کارشناس پرستاری، سوپر واپرز آموزشی بیمارستان امام رضا (ج)، بجنورد، ایران

*نویسنده مسؤول: بجنورد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

پست الکترونیک: Majid.Ghafoori@NKUMS.ac.ir

وصول: ۱۳۹۱/۶/۱۸ پذیرش: ۱۳۹۱/۹/۷

چکیده

مقدمه: بیماران HIV مثبت معمولاً بعد از آلودگی و طی دوره اولیه عفونت (سندروم رتروویروس حاد) وارد مرحله نهفتگی می‌شوند. گاهای این بیماران حتی از آلودگی خود بی خبرند و تظاهر اولیه این آلودگی غالباً با یک عفونت ناشی از نقص سیستم ایمنی نمایان می‌شود. یکی از عوارض ناشی از آلودگی HIV عوارض عصبی و بیماریهای طناب نخاعی و اعصاب جمجمه‌ای است. واکوئولار میلوپاتی یک عارضه عصبی است که تنها در ۲۰٪ بیماران مبتلا به ایدز دیده می‌شود.

گزارش مورد: این گزارش یک جوان ۲۰ ساله مبتلا به HIV بدون ریسک فاکتور قطعی انتقال HIV است که تظاهر اولیه بیماری به شکل کوادری پارزی ناشی از واکوئولار میلوپاتی است. هدف از این گزارش خاطر نشان کردن اهمیت وجود ناقلين بی علامت HIV، اهمیت انتقال و برخورد با تظاهرات نامعمول HIV به جامعه پزشکی و مسئولین بهداشتی می‌باشد.

واژه‌های کلیدی:

میلوپاتی: بیماری طناب نخاعی که یکی از عوارض ایدز است.

اج آی وی: ویروس نقص ایمنی انسانی

ایدز AIDS: سندروم نقص ایمنی اکتسابی

مقدمه

ویروس HIV از گروه رتروویروس‌ها و زیر خانواده لنتی ویروسهاست که به سلولهای سیستم ایمنی بدن حمله می‌کند و نهایتاً ایجاد سندروم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) می‌کند [۱]. ویروس HIV را لوک مونتانیه فرانسوی و رابرт گاللوی آمریکایی کشف کردند [۲]. عوارض عصبی در نهایت در اکثر بیماران مبتلا به HIV بروز می‌کند که از اختلالات خفیف شناختی تا دمانت شدید و عفونت‌های خطربناک CNS متغیرهستند [۲]. میلوپاتی به دو شکل میلوپاتی تحت حاد پیشرونده واکوئولار و میلوپاتی سایتومگالوویروس در بیماران HIV مثبت بروز می‌کند [۱]. شایعترین علت اختلال عملکرد

طناب نخاعی در بیماران ایدزی درمان نشده، میلوپاتی

واکوئولار است [۵] تظاهر اولیه بیماری به شکل عوارض نسبتاً کمیاب عصبی در یک بیمار برای بار اول معمولاً نادر بوده و گزارش آن قابل ملاحظه است.

آشنایی هر چه بیشتر با ویروس HIV، سندروم ایدز، راههای انتقال عفونت، علائم بالینی و عوارض این بیماری در ارگانهای مختلف یکی از نیازهای ضروری پزشکان و بویژه متخصصین عفونی است. لذا این گزارش توصیف یک تظاهر عصبی ناشی از ویروس HIV است که به عنوان اولین تظاهر بالینی در یک مرد جوان بروز کرد و راهکاری جهت آگاهی از آلودگی فرد به ویروس HIV شد.

ضربان قلب: ۷۸ و درجه حرارت بدن ۳۷/۵ درجه سانتی گراد بود.

در سابقه پزشکی هیچ سابقه بیماری خاصی نداشت. سابقه اختلال ادراری به شکل تکرار ادرار و تعجیل در ادرار داشت. سابقه مسافرت داخلی و خارجی نداشت. سابقه تماس جنسی با غیر از همسر را نمی داد. سابقه عمل جراحی، تزریق خون، اعتیاد تزریقی و بیماری مشابه را در خانواده نداشت. داروی خاصی هم مصرف نمی کرد. بیمار با احتمال تشخیص عفونت HIV و عوارض حاصل از نقص اینمی بسته و تحت بررسی قرار گرفت.

آزمایشات درخواستی: بیمار با تشخیص مرحله بالینی ۳ از تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی [۲] تحت درمان با لامیووین، زیدووین و افاویرنز به عنوان درمان ضد رتروویروسی و فلوکونازول و آسیکلورویر و کوتريموکسازول قرار گرفت [۴]. ضمناً رژیم غذی از متیونین هم برای بیمار در نظر گرفته شد [۱].

در پیگیری خانواده بیمار همسر بیمار که خانم جوان ۱۵ ساله ای بود هم به عنوان HIV مثبت شناخته شد در ادامه بررسی ها western blot همسر بیمار هم مثبت شد. مراتب جهت بررسی بیشتر اپیدمیولوژیکی به معاونت بهداشتی دانشگاه اطلاع داده شد اما متسفانه بیمار با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کرد.

گزارش مورد

بیمار آقای جوان ۲۰ ساله اهل و ساکن روستا، متاهل (۸ ماه قبل ازدواج کرده) که با شکایت ضعف، بی حالی و کرختی اندام تحتانی از ۲ ماه قبل از تشخیص به متخصص اورتوپدی مراجعه می کند. متخصص اورتوپدی بعد از معاینه، انجام MRI و بررسی کوادری پارزی بیمار را به نورولوژیست ارجاع می دهد. بیمار یک روز بستری و سپس با رضایت شخصی بیمارستان را ترک می کند. دو هفته بعد مجدداً با بدتر شدن حال عمومی و بروز یکسری ضایعات جلدی به نورولوژیست مراجعه می کند. نورولوژیست بعد از رویت ضایعات جلدی، بیمار را به متخصص عفونی ارجاع می دهد. در معاینه اولیه شکایت اصلی بیمار، ضایعات پوستی در قسمت سینه و پشت، ضعف اندام تحتانی، اختلال راه رفت و عدم توانایی بلع بود.

در معاینه فیزیکی، ضایعات ماکولوپاپولر وسیع در سطح پوست، کاندیدیازیس شدید در ناحیه اوروفارنژیال، ضایعات وزیکولوپاپولر دردناک در درماتوم سینه ای و پشتی (زونا) رال مختصر در قواعد ریه ها و کوادری پارزی پیشرونده در اندام تحتانی بود. در معاینه عصبی تتراپارزی اسپاستیک پیشرفته داشت. اختلال حسن، درد و حساسیت نداشت اما حس عمقی مختل بود. سطح حسی واضحی نداشت. علائم حیاتی، فشار خون: ۱۱۰/۷۵ ، تعداد تنفس: ۱۶ ، تعداد

CBC: WBC: 5600 RBC: ۴/۲۵۰/۰۰۰ Hb :11/1 PLT:649000 ESR:55 RPR :Neg HbsAg:Neg HovAb :Neg HTLV1-2:Neg B12 level: Normal	FBS: 95 Lipid profile: normal AST:22 ALT:21 ANA: Neg CRP: Neg RF: Neg	Cmv IgG & IgM :Neg Wright:Neg 2ME: Neg Coombs wright:Neg U/A: Normal
HIV1- Elisa + recheck + Westem blot : + ○		

بحث

میلوباتی واکوئولار مرتبط با HIV شایعترین علت اختلال عملکرد طناب نخاعی در بیماران ایدزی درمان نشده می باشد [۵]. این میلوباتی در مراحل دیررس عفونت HIV ایجاد می شود [۶]. معمولاً همراه با دمانس ایدز و پلی نوروپاتی حسی دیستال می باشد [۷] ضعف پاها، اسپاسیتی و اختلال حس عمقی باعث اختلال حرکتی این افراد می شود. اغلب اختلال اسفنگتیری دارند. درد پشت علامت واضحی نمی باشد [۵] در معاینه هایپرفلکسی، اسپاسیتی و اختلال حس عمقی پاها دیده می شود. سطح حسی معمولاً وجود ندارد و معمولاً در میلوباتی واکوئولار اندام های فوقانی مصون می مانند مگر بیماری بسیار پیشرفته کنده MRI معمولاً یافته واضحی ندارد گاهی آتروفی طناب نخاعی را نشان می دهد [۵]. یافته های پاتولوژیک در قسمت طناب نخاعی توراسیک دورسولترال دیده می شود و قابل توجه ترین یافته ایجاد تغییرات واکوئولی در غلاف میلین با حفظ شدن نسبی آکسون ها می باشد. علیرغم شباهت پاتولوژیک و بالینی دزتراسیون مختلط ناشی از کمبود Vit B₁₂، در این افراد سطح این ویتامین طبیعی است [۵]. آزاد شدن سیتوکین های Vit B₁₂ یا اختلال در مصرف HIV یا نوروتوکسیک توسط HIV ممکن است در پاتوزنر این بیماری دخالت داشته باشند. اگر چه علت قطعی واکوئولار میلوباتی نامعلوم است ولی حمله ویروس HIV به نخاع را مسئول این اختلال می دانند [۶]. شواهدی که نشان دهد کنترل ویروس می تواند در بهبود عملکرد نوروپاتی نقش داشته باشد در بیماران دچار این میلوباتی اثبات شده است. اما چندین گزارش در این زمینه وجود دارند که دلالت بر اهمیت تلاش در کنترل عفونت می باشد. بعلاوه این میلوباتی غالباً همراه دمانس HIV است که این دمانس به دنبال HAART و کنترل ویروس به بهبودی اثبات شده ای دارد [۵].

میلوباتی واکوئولار با واکوئولاسیون ماده سفید در طناب نخاعی، بویژه در ستونهای جانبی و خلفی طناب توراسیک مشخص می گردد، علت این وضعیت گرفتاری مستقیم طناب نخاعی توسط HIV است [۱].

۲۰٪ مبتلایان به ایدز در اتوپسی میلوباتی واکوئول در نخاع دیده می شود [۳]. ولی در جستجوهای مختلف

همراهی واکوئولار میلوباتی را با ایدز حدوداً ۳۰٪ در بزرگسالان تخمین زده اند [۶]. میزان بروز واکوئولار میلوباتی در کودکان مبتلا به HIV به میزان بیشتری به چشم می خورد [۶].
بسیاری از عفونت ها، اختلالات نئوپلاستیک و متابولیک گاهی سبب میلوباتی در بیماران ایدز می شوند در مقایسه با میلوباتی واکوئولار این اختلالات ممکن است سریع تر پیشرفته کنند و اغلب همراه درد پشت و درد رادیوکولار می باشند ویروس های CMV، VZV و HSV ممکن است باعث میلیت شوند. در عفونت های ویرال اغلب تورم نخاع و جذب ماده حاجب و تغییر سیگنال طناب نخاعی در MRI دیده می شود [۵]. میلوباتی در ایدز می تواند ناشی از لمفوم، عفونت کریپتوکوکی یا هرپس ویروس ها هم باشد. آنالیز مایع مغزی نخاعی معمولاً طبیعی است و میزان بار ویروسی در CSF افزایش پیدا نمی کند [۱]. اما میلوباتی ناشی از CMV، زونا، هرپس تشخیص این بیماری معمولاً با رد کردن سایر علل است [۱]. دیگر علل میلوباتی که HIV را با مشکل بیشتری مواجه می کنند شامل نوروسفلیس، کمبود ویتامین B₁₂، TB، توکسپولاسما متابستازهای اپیدورال ناشی از لغوم های سیستمیک در بیماران مبتلا به HIV می باشند [۶]. در واکوئولار میلوباتی ناشی از HIV معمولاً سطح-S-adenosylmethionin میتونین در سرم کاهش می یابد [۱]. درمان واکوئولار میلوباتی درمان ضد رترووویروسی HAART است و رزیم غنی از میتونین به مدت ۶ ماه توصیه می شود [۱]. تشخیص مناسبی برای این افراد در نظر گرفته نمی شود و معمولاً ۶ ماه بعد از شروع علائم میلوباتی فوت می کنند [۶].

References

1. Mandell,Douglas and Bennets ,Principles and practice of infectious Diseases ,seven edition 2010.vol3.chapter 124,p: 1754-1755
2. hajibabdolbaghi,Alinaghi,Zandiye,An HIV practical protocol 2010.P;163-183[Persian]
3. Tabatabaei and “et al”, Principles of Disease prevention and surveillance2008,chapter3p:163-174
4. Dworkin RH, Johnson RW,Brruera,”et al”, Recommendations for the management of herpes zoster ,clin infect Dis,Jan 1 2007
5. Brandley we , Daroff RB, Fenichel GM,Jankovic j ,Neurology in clinical practice 2008,fifth Ed,p:1547-1550
6. HIV, associated vacuolar myelopathy ,Health 24Journal, Aug22,2011
7. Niranjan N singh,MD,kaven L Roos, MD, HIV, associated vacuolar myelopathy ,JUL15,2011

Case Report

Vacuolar myelopathy in HIV positive

Ghafouri M¹ *,Derakhshan S²,Rahimi M³

¹ Assistant Professor of Infections diseases, North khorasan University of Medical Sciences , Bojnurd, Iran

² Assistant Professor of Neurology , North khorasan University of Medical Sciences , Bojnurd, Iran

³ Educational Supervisor in Emam Reza Hospital , North khorasan University of Medical Sciences , Bojnurd, Iran

***Corresponding Author:**
North khorasan university of medical sciences , Bojnurd, Iran
Email:
Majid.Ghafoori@NKUMS.ac.ir

Abstract

HIV positive patients have incubation period which is usually after infection and during the primary stage (acute retroviral syndrome). HIV positive patients are often unaware of their infections and early clinical manifestation of this infection is associated with an infection resulted from immuno suppression. Neurologic complications of HIV include spinal cord and cranial nerves diseases. Vacuolar myelopathy is a neurologic complication with 20% prevalence in AIDS stage. Here a 20 years old HIV positive case , without definite HIV risk factors and early clinical manifestation of quadriplegia resulted from vacuolar myelopathy is being reported. The goal of this report is to remind the importance and attention of asymptomatic HIV carriers and variety of contagious transmission and correct management of these complications to health community and authorities .

Key word: myelopathy –HIV-AIDS

Submitted:8 Sep 2012

Accepted: 27 Nov 2012