

مقاله پژوهش

وضعیت سلامت جسمی و روانی سالمندان شهر کرمان

وحید رضا برهانی نژاد^۱، ویکتوریا مؤمن آبادی^۲، سید حمید حسینی^۳، طاهره منصوری^۴
، احمد صادقی^۵، مهدی طرسکی^{۶*}

^۱دانشجوی دکتری سالمندشناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمیسری، کمیته تحقیقات HSR
دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ایران.

^۲دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، گروه خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
کرمان، ایران

^۳کارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین،
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران.

^۴دانشجوی دکتری سالمندشناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران.

^۵دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۶دانشجوی دکتری اقتصاد دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

*نویسنده مسئول: دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

پست الکترونیک: Mehditroski @ gmail.com

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش امید به زندگی، میانگین و میانه سنی جمعیت و تعداد و نسبت افراد سالمند افزایش یافته است و برای برنامه ریزی ارائه خدمات به این جمعیت، دسترسی برنامه ریزان به اطلاعات دقیق ضروری است. در نتیجه هدف این مطالعه بررسی سلامت جسمانی و روانی سالمندان در شهر کرمان می باشد که شواهد مناسبی را در اختیار برنامه ریزان قرار خواهد داد.

مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که در آن ۴۰۰ نفر از سالمندان شهر کرمان به روش نمونه گیری چند مرحله ای در سال ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار های بررسی توانائی انجام فعالیتهای روزانه (ADL)، پرسشنامه SF36 تست Kessler-K6 و پرسشنامه استاندارد احساس سلامتی و نشاط روانی Yeild استفاده گردید. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 و با آزمون های آماری کای دو، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بیش از نیمی از سالمندان از نظر اختلالات اضطراب و افسردگی مشکلاتی داشتند (۳۵/۳٪ درصد). در بررسی احساس سلامتی و نشاط روانی اظهار تنهایی شایع ترین شکایات سالمندان بود. در انجام فعالیتهای روزمره ۶۵٪ سالمندان مستقل، ۱۴٪ وابسته و ۳۰ درصد وابسته نسیی بودند. در عملکرد فیزیکی ۲۲/۲٪ از سالمندان دارای محدودیت شدید، ۳۵/۲٪ محدودیت متوسط و ۳۳/۶٪ دارای محدودیت کمی بودند.

نتیجه گیری: با توجه به مشکلات فراوانی که در دوران سالمندی وجود دارد، لذا باید با تدوین برنامه های اصولی و کاربردی در جهت به حداقل رساندن اثرات این مشکلات و کمک به حفظ هر چه بیشتر استقلال سالمندان کمک نمود.

واژه های کلیدی: سالمندان، اضطراب، افسردگی، سلامت جسمی و روانی، عملکرد فیزیکی

مقدمه

بهبود شرایط زندگی و افزایش طول عمر و امید به زندگی پدیده سالمندی را در جوامع به دنبال داشته است [۱]. پدیده افزایش جمعیت سالمندان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در قرن بیست و یکم به شمار می‌رود [۲]. از طرفی رشد جهانی جمعیت سالمندان هم برای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی و هم برای اعضای خانواده و جامعه ای که سالمندان در آن زندگی می‌کنند یک چالش مهم محسوب می‌گردد. سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است، که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر افزایش ابتلا به بیماریهای مزمن، تنها و انزوا، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و ذهنی در موارد زیادی نیز استقلال فردیشان مورد تهدید قرار می‌گیرد [۳]. بنابر آمار ارایه شده توسط سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۰۰، افراد سنین ۶۰ سال و بالاتر حدود ۶۰۰ میلیون نفر بوده است و این تعداد تا سال ۲۰۲۵ به ۲/۱ بیلیون نفر خواهد رسید. همچنین بیش از دو سوم جمعیت سالمند در کشورهای رو به توسعه به ویژه آسیای شرقی بوده و تا سال ۲۰۲۵ افزایش بیش از ۳۰۰ درصد جمعیت سالمند در این کشورها مورد انتظار است [۴]. این چالش به موقعیت دموگرافیکی کشور ایران نیز مربوط می‌شود. کشور ایران نیز بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، طی دهه‌های اخیر تغییرات مشابهی را در بار بیماری‌ها و ساختار جمعیت خود تجربه کرده است. اجرای برنامه‌های توسعه در بخش آموزش و سلامت بخصوص بعد از انقلاب اسلامی، باعث کاهش بار بیماری‌های عفونی و مرگ و میر ناشی از آن گردید. اجرای برنامه کنترل موالید نیز باعث گردید که ضریب رشد جمعیت از حدود ۰/۳/۵ در دهه ۶۰ به ۱/۳ در سال ۱۳۹۰ و نسبت افراد ۶۰ سال و بالاتر از ۰/۳/۲ در سال ۱۳۳۵ به ۸/۲۶٪ در سال ۱۳۹۰ بررسد. پیش‌بینی شده در صورت ادامه روند شاخص‌های باروری، بیش از ۲۰٪ جمعیت ایران در سال ۲۰۵۰ سالمند باشند [۵]. یک تفاوت عمده بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه نظیر ایران وجود دارد، در حالی که دولت و مردم در کشورهای توسعه یافته کاملاً آماده اند

روش کار

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۱ انجام شد. جامعه آماری مورد بررسی در این مطالعه، سالمندان (افراد بالای ۶۰ سال) در شهر کرمان بودند. جهت تعیین حجم نمونه در سالمندان مورد مطالعه با استفاده از فرمول و با در نظر گرفتن اطمینان آماری ۹۵٪ ($Z \cong 2$ و $d = 0.05$ ٪)، درصد و دقت ۵٪ (۰.۹۵٪)، اندازه نمونه لازم برای

نماينگر عملکرد فизيکي بهتر و بدون محدوديت بود و امتياز پايانين تر نشانگر عملکرد فيزيكي بدتر با محدوديت شديد بود. امتياز بندى سه سطح شامل: بدون محدوديت در عملکرد فيزيكي (۳۰ - ۲۴)، تا حد محدود (۲۳ - ۱۷)، محدوديت شديد يا فعالیت بسيار محدود (۱۶ - ۱۰) مى باشد. روایي و پايای اين پرسشنامه در ايران مورد بررسی وضعیت سلامت روانی از مقیاس پریشانی کسلر^۲ و Kessler-^۳ پرسشنامه استاندارد Yeild استفاده شد. تست K6 پرسشنامه ۶ سؤالی است که سطح اضطراب و افسردگی را در ۴ هفته قبل از پرسشگری در مورد احساسات غم، عصبی بودن، بیقراری، نا امیدی، تلاش و بی ارزشی را سؤال می کند. پاسخ ها در يك محدوده ۵ امتيازی شامل: "هميشه"، "اکثر اوقات"، "بعضی وقت ها"، "بندرت" و "هیچ وقت" جمع آوري شدند. حداقل امتياز اين پرسشنامه ۶ و حداقل ۳۰ است و امتياز بين ۶ تا ۱۴ به مفهوم پریشانی روانی شديد، ۱۵ تا ۲۲ پریشانی روانی متوسط و امتياز بين ۲۳ تا ۳۰ به مفهوم پریشانی روانی کم در نظر گرفته شده است. پايایي اين ابزار در مطالعه علیزاده و همكاران با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۶ به اثبات رسيده است [۱۷]. ابزار سنجش احساس سلامتی و نشاط روانی^۳ پرسشنامه استاندارد Yeild می باشد که يك پرسشنامه ۵ سؤالی است که اين احساس را در سالمدان مورد مطالعه از طریق پرسش در مورد احساس شادي، آرامش/صلاح، کسالت، تنهایی و افسردگی در ۴ هفته اخير می سنجد. کدهای پاسخی در سه گزینه هیچ وقت، گاهی اوقات، و بیشتر اوقات طبقه بندی می گرددند حداقل امتياز ۱۵ و حداقل امتياز ۵ می باشد. امتياز ۱۳ تا ۱۵ به عنوان احساس سلامتی و نشاط روانی، امتياز ۹ تا ۱۲ به عنوان احساس سلامتی و نشاط روانی نسبی و امتياز ۵ تا ۸ به عنوان عدم احساس سلامتی و نشاط روانی محسوب می شود. پايایي اين ابزار نيز در مطالعه علیزاده و همكاران با ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۸ مورد تأييد قرار گرفته است [۱۷]. سپس داده های جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS^{۱۷} تحليل شد. برای

انجام اين مطالعه ۴۰۰ محاسبه گردید. برای نمونه گيرى از روش نمونه گيري چند مرحله اي استفاده شد. از ۳۵ پايكاه و مركز بهداشتى درمانى در شهر كرمان، ۲۰ پايكاه به طور تصادفي انتخاب و از بين سالمدان تحت پوشش هر پايكاه، ۲۰ نفر به طور تصادفي انتخاب شد و پس از مراجعه به درب منزل آنها پرسشنامه هريک تكميل گردید. قبل از تكميل پرسشنامه ضمن توضيح هدف از اجرای تحقيق برای افراد به آنها اطمینان داده شد که اطلاعات پرسشنامه کاملاً محرمانه خواهد ماند. برای ارزیابی سلامت جسمانی از پرسشنامه های استاندارد وزارت بهداشت استراليا که در پیمايش کشوری بررسی وضعیت سلامت سالمدان در اين کشور اجرا گرفت و در تحقيق مشابه در ايران نيز استفاده شده است بهره گرفته شد [۱۳، ۱۴]. ابزار سلامت جسمانی شامل ارزیابی عملکرد فعالیت روزمره زندگی سالمند و تست عملکرد فيزيکي بود. جهت سنجش وضعیت توانائی انجام فعالیتهای روزانه (ADL^۱) از سالمدان مورد مطالعه در خصوص توانائی انجام اين فعالیتهای دوش گرفتن / حمام کردن، لباس پوشیدن، توالت رفتن، جابجا شدن در منزل و غذا خوردن به تنهائي و بدون نياز به کمک يا نظارت ديگران سؤال شد. برای هر يك از موارد فوق دو پاسخ بسته "بلی" و "خیر" وجود دارد. پاسخ ها به ۵ سؤال فوق، امتياز بندی و جمع شده و نتيجه رتبه بندی براساس امتيازات کسب شده به صورت وابسته (صفر و يك)، نيازمند کمک (دو و سه)، مستقل (چهار و پنج) بيان گردید به طوری که امتياز بالا نشان دهنده استقلال بيشتر فرد بود [۱۵]. عملکرد فيزيکي، توان فردی سالمند را برای انجام فعالیت های شديد و متوسط از طریق ۱۰ سؤال موجود در تست SF-36 اندازه گيري می کند. تعداد سوالات تست مذکور ۳۶ سؤال است، ولی در اين پژوهش به منظور اندازه گيري عملکرد فيزيکي افراد مورد مطالعه از ۱۰ سؤال مرتبط با پژوهش اين تست استفاده شد. اين سوالات شامل ۱۰ سؤال در مورد انجام فعالیت های شديد و متوسط در محدوده "خيلي زياد"، "تا حدودي" و "اصلا محدود نمى کند" بوده و امتيازات پاسخ ها با هم جمع شده و عدد حاصل بصورت نسبت از ۳۰ تحليل شد. امتياز بيشتر

سطح متوسط (نسبی) از نظر احساس سلامتی و نشاط روانی ۱ قرار داشتند، حدود ۱۲/۷٪ در سطح بدی (عدم) از این نظر قرار داشتند و حدود ۴۰/۱٪ در سطح خوبی (کامل) از احساس سلامتی و نشاط روانی قرار داشتند (جدول ۱). بر این اساس ۱۵۴ نفر از سالمدان مورد بررسی، بیشترین شکایتشان در یک ماه قبل بررسی احساس تنها ی بود (۳۸/۵٪). ۳۷ درصد از سالمدان در مدت مذکور هیچ وقت احساس شادی و خوشحالی نداشته اند و ۳۶/۳ درصد هیچوقت احساس آرامش و راحتی نداشته و درصد نیز بیشتر اوقات احساس یکنواختی داشتند و در نهایت بر اساس مقیاس مورد نظر ۴۷/۲ درصد سالمدان مورد مطالعه طی یک ماه قبل بررسی بیشتر اوقات احساس افسردگی داشتند. از طرفی بین سن، جنسیت و تحصیلات سالمدان مورد مطالعه با احساس سلامتی و نشاط روانی ارتباط معنی دار وجود دارد (P < 0.05). سطح بندی امتیازات ADL مطالعه حاضر نشان داد که در فعالیت های روزمره زندگی، بیش از نیمی از سالمدان (۵۶٪) مستقل و ۱۴٪ وابسته و ۳۰ درصد نیازمند کمک بودند. همچنین از میان فعالیتهای روزمره زندگی، توانائی غذا خوردن بیشترین (۶۳/۵٪) و توانائی جابجا شدن در منزل کمترین موارد (۵۷/۵٪) را داشت. بین سن، وضعیت تأهل و تحصیلات سالمدان با توانایی او در انجام فعالیت های روزمره زندگی ارتباط معنی داری وجود داشت (P < 0.05). نتایج بررسی نشان داد که ۲۲/۲٪ از سالمدان دارای محدودیت شدید و ۳۵/۲٪ محدودیت متوسط و ۳۳/۶٪ نیز محدودیت کمی در عملکرد فیزیکی داشتند. بر اساس گفته آنان ۶۴/۴٪ آنان دارای محدودیت در انجام فعالیت های فیزیکی شدید از قبیل دویدن بلند کردن اجسام سنگین و یا ورزش های سنگین، حدود ۴۶/۵٪ محدودیت متوسط در انجام فعالیت های متوسط از قبیل حابجایی میز، کشیدن حارو بر قی یا پیاده روی در سطح ناهموار، ۶۱/۷٪ دارای محدودیت در خرید و حمل خواربار و کیسه های خرید حاوی مواد غذایی بوده و ۶۲/۵٪ دارای محدودیت در بالا رفتن از چند پله، ۵۹/۴٪ از آنان

تعیین معنی دار بودن رابطه متغیرهای دموگرافیک با سلامت جسمانی، روانی و برای تعیین و مقایسه سطح سلامت جسمی و روانی از آزمون کای دو، تی تست و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید.

یافته ها

بیشتر افراد (۵۶ درصد) شرکت کننده در گروه سنی ۷۴-۶۰ بودند. از نظر جنسیت بیشتر مرد بودند (۵۲/۵ درصد) و بیشتر شرکت کنندگان در مطالعه متأهل بودند (۷۸/۵٪). از نظر سطح تحصیلات، ۱۶/۵ درصد بی سواد، ۴۲ درصد سالمدان مورد مطالعه دارای سواد خواندن و نوشتن، ۱۲ درصد دارای تحصیلات ابتدائی، ۱۸/۵ درصد متوسطه و ۱۴ درصد دیپلم و بالاتر بودند و از نظر شغلی بیشترین درصد مربوط به افراد خانه دار (۲۳٪) و کمترین درصد مربوط به افراد دارای شغل دولتی بودند (۵٪). از نظر ابتلا به اختلالات و بیماریها در سالمدان مورد مطالعه، بیشترین درصد مربوط به مشکلات بینایی بود (۴۵/۲ درصد) پس از آن اختلال خواب (۴۴/۶ درصد)، مشکلات دهان و دندان (۴۲/۱ درصد)، فشار خون (۳۳/۶ درصد)، چربی خون (۲۶/۸ درصد)، حملات تنگی تنفس (۱۹/۷ درصد)، احساس درد و خستگی (۱۷/۸ درصد) دیابت (۹/۲ درصد) و اختلال تکلم (۷/۳ درصد) در بین سالمدان مورد بررسی وجود داشت. در خصوص وضعیت سلامت روانی نتایج نشان داد بر اساس مقیاس کسلر ۹/۶ درصد سالمدان پریشانی روانی شدید، ۴۳/۷ درصد پریشانی روانی متوسط و ۴۶/۷ درصد پریشانی روانی کمی ابراز نمودند. بر این اساس بیش از نیمی از سالمدان از نظر اختلالات اضطراب و افسردگی مشکلاتی داشتند (جدول ۱). ۳۱ درصد سالمدان بیان کردند که در طی یک ماه قبل از بررسی همیشه یا بیشتر اوقات احساس غمگینی، ۲۹/۴ درصد احساس دشواری و مشکل در انجام کارها ، ۲۷/۳ درصد سالمدان احساس عصبی، ۲۵/۴ درصد احساس اضطراب و بی قراری، ۱۲/۸ درصد احساس یأس و نامیدی و در نهایت ۸ درصد همیشه یا بیشتر اوقات احساس پوج بودن و بی ارزشی داشته اند. همچنین بین سن، وضعیت تأهل و جنسیت با پریشانی روانی ارتباط معنی دار وجود داشت (P < 0.05). همچنین بر اساس یافته های تحقیق بیشتر افراد (۴۷/۲٪ درصد) در

جدول ۱: وضعیت سلامت روانی سالمندان مورد مطالعه بر اساس شاخصهای مورد مطالعه

مقیاس	(درصد) تعداد
پریشانی روانی	شدید ۳۸ (۹/۶)
احساس سلامتی و نشاط روانی	متوسط ۱۷۵ (۴۳/۷)
	کم ۱۸۵ (۴۶/۷)
	کامل ۱۵۷ (۴۰/۱)
	نسبی ۱۸۹ (۴۷/۲)
	فقدان ۵۱ (۱۲/۷)

جدول ۲: وضعیت سلامت جسمی سالمندان مورد مطالعه بر اساس شاخصهای مورد مطالعه

شاخص	تعداد
توانایی انجام فعالیتهای روزمره	مستقل ۲۲۴ (۵۶)
	نیاز به کمک ۱۲۰ (۳۰)
عملکرد فیزیکی	وابسته ۵۶ (۱۴)
	محدودیت شدید ۸۹ (۲۲/۲)
	محدودیت متوسط ۱۴۱ (۳۵/۲)
	محدودیت کم ۱۸۹ (۳۳/۶)

و وجود تفاوت در امکانات اقتصادی و اجتماعی، سطح سلامت روانی افراد هم از این شرایط تأثیر می‌پذیرد. بین سن سالمندان مورد مطالعه با پریشانی روانی و با احساس سلامتی و نشاط روانی ارتباط معنی دار وجود داشت. به نحوی که با افزایش سن به میزان پریشانی روانی افزوده شده و از احساس سلامتی و نشاط روانی کاسته می‌شد. در مطالعه مباشری در شهرکرد و خوش کنش در شهر سبزوار نیز رابطه همبستگی معکوس بین سن و سلامت روانی وجود داشت [۲۲، ۲۱] با بالا رفتن سن مشکلات جسمی و روانی در سالمندان افزایش پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد این مشکلات محدودیتهای را برای آنها ایجاد می‌کند که می‌تواند دلیلی بر کارکرد روانی ضعیفتر در سنین بالا باشد، لذا توجه بیشتر اعضای خانواده، مراقبین و همچنین مؤسسات مراقبتی و حمایتی را در این خصوص می‌طلبد. بین جنسیت سالمندان با پریشانی روانی و همچنین با احساس سلامتی و نشاط روانی نیز رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید. به طوریکه زنان سالمند احساس پریشانی روانی بیشتر و سلامتی و نشاط روانی کمتری را ابراز نمودند. بررسی کارل نیز نشان داد که زنان سالمند بیشتر دچار افسردگی شده ولی با افزایش سن تقریباً شیوع افسردگی در هر دو جنس برابر می‌شود [۲۳]. با توجه به خودگزارش دهی بودن پرسشنامه، اینکه زنان در این مطالعه پریشانی روانی بالاتری را ابراز نمودند می‌تواند ناشی از توجه و وسواس بیشتر زنان به وضعیت سلامتی خود باشد و یا اینکه به طور کلی زنان در موقعیتهای مختلف زندگی آسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند. بین وضعیت تأهل سالمندان با پریشانی روانی نیز رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید. در واقع سالمندان مجرد احساس پریشانی روانی بالاتری داشتند. در مطالعه سهرابی در شاهروود نیز متأهلین وضعیت بهتری از نظر اضطراب و افسردگی داشتند [۲۴] به نظر می‌رسد افراد متأهل از یک شبکه حمایتی قوی تر به همراه روابط اجتماعی و همچنین صمیمیت بیشتری برخوردارند که تمامی این موارد می‌توانند منجر به سلامت روانی پایدارتر و بهتری برای سالمندان متأهل شود. از طرفی بین تحصیلات افراد مورد مطالعه با احساس سلامتی و نشاط روانی نیز رابطه معنی دار وجود داشت. به این صورت که

محدودیت عملکردی در پیاده روی بیش از یک کیلومتر و ۴۸٪ از آنان محدودیت حرکتی در خم شدن زانو داشتند. بین سن، جنسیت و میزان تحصیلات سالمندان مورد مطالعه با میزان عملکرد فیزیکی ارتباط معنی دار وجود دارد (۰/۰۵ P).

بحث

شناخت وضعیت سلامت سالمندان می‌تواند در تدوین برنامه‌های کاربردی و زیربنایی جهت این گروه از جامعه مؤثر واقع گردد. در خصوص وضعیت سلامت روانی بیشتر سالمندان مورد مطالعه پریشانی روانی متوسط داشتند و هر کدام از درجاتی از احساس غمگینی، احساس دشواری در انجام کارها، احساس عصبی، احساس اضطراب و بی قراری، احساس یأس و نامیدی و احساس پوچ بودن و بی ارزشی در طی یک ماه قبل از بررسی برخوردار بودند. همچنین از نظر احساس سلامتی و نشاط روانی کمتر از نیمی از سالمندان (۰/۴۷٪) در سطح متوسط. ۷/۱۲٪ در سطح بد و ۱/۴۰٪ در سطح خوبی از این نظر قرار داشتند. شکایت غالب سالمندان مورد مطالعه احساس تنها یی بود و بیش از نیمی سالمندان مورد مطالعه بیشتر اوقات احساس افسردگی داشتند. در مطالعه علیزاده در سالمندان تهران بیشتر افراد (۳/۵۶٪) دارای پریشانی روانی کمی بودند و درصد زیر مقیاسهای پریشانی روانی هم نسبت به مطالعه حاضر متفاوت بود [۱۸] در حالیکه در بررسی علیزاده اکثریت سالمندان ایرانی مهاجر در استرالیا دارای حد متوسطی از نشانه‌های اضطراب و افسردگی بودند و بیش از نیمی از آنان سطح متوسطی از احساس سلامتی و نشاط روانی را ابراز نمودند [۱۷]. مطالعه نجاتی در شهر قم میزان افسردگی را برای سالمندان مورد مطالعه ۳/۴۸٪ به دست آورده بود [۱۹]. یافته‌های مطالعه ای در آمریکا نیز نشان داد که ۱۲ درصد سالمندان به افسردگی شدید مبتلا می‌باشند [۲۰]. یکی از دلایل این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت‌های فرهنگی بین جوامع باشد، به نحوی که سالمندانی که در کشورهای مختلف و حتی در شهرهای مختلف یک کشور زندگی می‌کنند دارای دید متفاوت نسبت به زندگی می‌باشند و این مهم وضعیت سلامت روانی آنها را متفاوت می‌کند. همچنین با توجه به نقش بارز شرایط محیطی و حمایتی در سلامت سالمندان

فعالیتهای روزمره استقلال بیشتری و در عملکرد فیزیکی محدودیت کمتری داشتند. به نظر می‌رسد در سنین بالاتر سالمدانی بروز ناتوانی‌ها بارزتر بوده و به صورت کاهش فعالیت جسمی و محدودیت‌های جسمانی ظاهر می‌شود. احتمالاً با توجه به اینکه با افزایش سن توانائی عملکردی سالمدان کاهش پیدا می‌کند و همچنین شانس ابتلاء به بیماریهای مزمن و محدود کننده بیشتر می‌شود، لذا رابطه معکوس سن با توانائی انجام فعالیتهای روزمره و عملکرد فیزیکی محتمل می‌باشد. همچنین تحصیلات بالاتر به افراد سالمدان کمک می‌کند که در رویارویی با برخی موقعیتهای دشوار سالمدانی تصمیمات بهتری اخذ کنند و در نتیجه از سطح سلامت بالاتری برخوردار بوده و توانائی بالاتری در انجام فعالیتهای روزمره و عملکرد فیزیکی مناسب خواهد داشت.

همچنین بین وضعیت تأهل و توانائی انجام فعالیتهای روزانه رابطه آماری معنی دار مشاهده گردید. احتمالاً وجود پیوند زناشویی همراه با صمیمیت در دوران سالمدانی عامل مثبتی برای حفظ قوای جسمی و ذهنی سالمدان خواهد بود، همچنین اینکه سالمدان متأهل از نظر عملکرد فیزیکی محدودیت کمتری داشتند، می‌تواند ناشی از این باشد که متأهل بودن به عنوان نقطه مثبتی در برخورداری از یک زندگی مستقر سالم به حساب می‌آید، لذا وجود حمایت خانوادگی برای زوجین سالمدان توانائی آنها در مراقبت از خود را ارتقاء داده و به حفظ استقلال فردی آنها کمک می‌کند. همچنین در این پژوهش بین جنسیت سالمدان با میزان عملکرد فیزیکی ارتباط معنی دار وجود داشت و زنان در این خصوص محدودیت بیشتری داشتند. این موضوع می‌تواند ناشی از این باشد که به طور کلی زنان به دلیل وجود تفاوت‌های آناتومی و فیزیولوژیک با مردان از توانائی بدنی کمتری برخوردار بوده و میزان آسیب پذیری در زنان سالمدان بیشتر می‌باشد، لذا محتمل به نظر می‌رسد که عملکرد فیزیکی آنها با محدودیت بشرطی باشد.

جهت برنامه ریزی صحیح به منظور دستیابی به سلامت سالمدان و تامین نیازهای این گروه سنی، اولین گام شناسایی وضع موجود می‌باشد [۲۹] در این بین بررسی

سالمدان با تحصیلات بالاتر احساس سلامتی و نشاط روانی بیشتری داشتند. بر اساس مطالعه بابک در اصفهان نیز، سالمدان دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر نسبت به تحصیلات دانشگاهی شیوع بیشتر افسردگی را نشان دادند [۲۵] در مطالعه سهرابی نیز وضعیت روانی ضعیف در افراد کم سعاد و بی سعاد به دست آمده بود [۲۶]. با توجه به اینکه تحصیلات از جمله عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هستند لذا تأثیر آنها بر وضعیت سلامت روانی افراد محتمل به نظر می‌رسد. احتمالاً متغیر تحصیلات موجب ایجاد شبکه ارتباطات قوی و پیوندهای اجتماعی بیشتری برای سالمدان خواهد شد که خود موجبات سلامت بهتر را برای آنها مهیا می‌سازد.

در خصوص وضعیت سلامت جسمانی بر اساس اظهارات سالمدان بیش از نیمی از آنها به طور مستقل دارای توانائی انجام فعالیتهای روزمره زندگی را داشتند. در پژوهش علیزاده ۸۳ درصد و در پژوهش نجاتی ۹۷/۲ درصد سالمدان از نظر توانائی انجام فعالیتهای روزمره زندگی خود مستقل بودند [۱۹، ۱۸]. یافته‌های مطالعه لی^۱ و همکاران در سالمدان تایوانی نیز نشان داد که ۶۲ درصد آنها در انجام فعالیتهای روزمره زندگی کاملاً مستقل بودند [۲۶] همچنین بر اساس مطالعه‌ای میزان وابستگی از نظر توانائی انجام فعالیتهای روزمره در سالمدان کشورهای کانادا (۰/۶)، فرانسه (۰/۱۰)، ایتالیا (۰/۱۴) و در سوئد ۱۱ درصد گزارش شده است [۲۷] همچنین نتایج بررسی نشان داد که ۲۲/۲٪ از سالمدان دارای محدودیت شدید و ۳۵/۲٪ محدودیت متوسط و ۳۳/۶٪ نیز محدودیتی در عملکرد فیزیکی نداشتند. این در حالی است که در پژوهش علیزاده ۸۵/۲ درصد سالمدان و در پژوهش افتخار اربیلی ۸۴/۴ درصد سالمدان مورد مطالعه در فعالیتهای فیزیکی شدید دچار محدودیت بودند [۲۸، ۱۸].

بین سن و تحصیلات سالمدان مورد مطالعه با توانایی آنها در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی و عملکرد فیزیکی ارتباط معنی داری وجود داشت، به این صورت که سالمدان با تحصیلات بالاتر و با سن کمتر از نظر انجام

مذکور به خاطر حمایت مالی و همکاران گرامی که در امر جمع آوری اطلاعات، مصاحبه و تکمیل پرسش نامه ها همکاری داشتند و همچنین کلیه سالمدان عزیزی که در اجرای این طرح صمیمانه ما را همراهی نمودند تشکر و قدردانی نماییم.

وضعیت سلامت جسمی و روانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است [۳۰].

سالمدانی یک رویداد مثبت در زندگی هر فرد می باشد و زندگی طولانی تر با کیفیت مطلوب، باید همراه با فرصلهای همیشگی برای سلامتی، مشارکت و امنیت باشد [۳۱]. سالمدان با مشکلات جسمی و روانی متعدد، در معرض افزایش ابتلاء به بیماری های مزمن، تنها یا و انزوا یوده و استقلال فردی آنها مورد تهدید قرار می گیرد و خطر سپردن آنها به مراکز مراقبتی ویژه سالمدان افزایش پیدا می کند [۳۲]، که خود منجر به صرف هزینه برای مراقبین و دولتها شده و کیفیت زندگی افراد مسن را کاهش می دهد. در رابطه با محدودیتهای این پژوهش باید یادآور شد شرایط خاص سالمدان مورد مطالعه در هنگام پاسخدهی به سوالات ممکن است بر نتایج مطالعه تاثیر گذار باشند که کنترل دقیق آنها از عهده پژوهشگر خارج بود. از دیگر محدودیتها می توان به مقطعی بودن این مطالعه اشاره نمود.

نتیجه گیری

با توجه به روند افزایشی جمعیت سالمدان توجه به سلامت، کاهش ناتوانیها و ارتقای کیفیت زندگی آنها ضروری است. همچنین تلاشها در برخورد با مسائل سلامتی سالمدان بایستی بیشتر به تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی معطوف شود، که این یک استراتژی مهم برای کاهش اینگونه تفاوت‌ها و به تعویق اندختن اختلال در سلامتی، ناتوانی و مرگ و میر می باشد. نیازهای رو به رشد جمعیت سالمدان مستلزم سیاستگزاری های بیشتر، خصوصاً در زمینه مراقبت و درمان و ترویج شیوه زندگی سالم و محیط حمایتی می باشد. در این بین انجام پژوهش های مشابه برای ارزیابی وضعیت سلامت سالمدان به همراه برنامه ریزی برای انجام انواع فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و ورزشی در قالب کار تیمی و گروهی در جهت حفظ استقلال آنها پیشنهاد می شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل طرح پژوهشی شماره ۹۱/۲۱۰ مصوب معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که لازم می دانیم از کمیته تحقیقات HSR و معاونت

References

1. K Phillips DR, Global Aging: The Challenge of Success, Population Bulletin, Population Reference Bureau 2005; 60 (1): 1-5.
2. Lunenfeld B, The ageing male: demographics and challenges, World Journal of Urology 2002; 20(1):11-16.
3. Marais S, Conradie G, Kritzinger A, Risk factors for elder abuse and neglect: brief descriptions of different scenarios in South Africa, International Journal of Older People Nursing 2006; 1(3): 186-9.
4. Sheykh M T, The Elderly and Family Change in Asia with a Focus in Iran: A Sociological Assessment, Journal of Comparative Family Studies 2006; 37 (4): 583-8. [persian].
5. IRAN SCo, Abstract of Census, Tehran, Iran: Presidency of the I.R.I, vice presidency for strategic planning and supervision2012. [persian].
6. Kagagn SH, The advanced practice nurse in an aging society, Journal of Nurse practitioner 2003; 20 (2): 110-15.
7. Morovatisharifabad MA, Ghofranipour FA, Heydarnia AR, Babaeirochi GR, Perceived religious support of health promoting behavior and status doing these behaviors in Aged 65 years and older in Yazd, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2004;12(1):23-9 [persian].
8. Federal Interagency Forum on Aging Older Americans: Key indicators of well-being, Available from:<http://www.agingstats.gov/chartbook2006/tablesealtrisks>.
9. AdibHajbagheri M, Akbari H, The tensity of disabilities and the factors related to it in elderly, Journal of scientific research 2009; 13(3): 225-34 .[persian].
- 10.Sadeghian A, Health status of elderly people in Shahrod city, Journal of Salmand 2011;6(20):26-30 [persian].
- 11.Heikkinen E, Functional capacity and health of elderly people -the Evergreen project, Scandinavian Journal of Social medicine supplement 1997;53:18-21.
- 12.Linden M, Horgas A, Gilberg R, Steinhagen E, Predicting health care utilization in the very old, The role of Physical health, mental health, attitudinal and social factors, Journal of Aging Health 1997;1(9):27-3.
- 13.New South Wales Department of Health, New South Wales Older People's Health Survey Public Health Bulletin Supplement, Health Department, Sydney: NSW Australia; 2000.
- 14.Alizadeh M, Matous M, Zekia H, Assessing health factors and utilization of aged care services in Iranian elderly in Metropolitan Sydney, Journal of payesh 2010;9(4):435-42 [persian].
15. Katz S, Ford A, Moskowitz R, Studies of illness in the aged, Journal of American Medical Association 1963;185: 914-9
- 16.Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B, The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version, Journal of Quality of life research 2005;14(3): 875-82 [persian].
- 17.Alizadeh M, Assessing health factors and utilization of aged care services in Iranian elderly in Metropolitan Sydney, Thesis faculty of health science, The Sydney University; 2008.
- 18.Alizadeh M, Fakhrzadeh H, Sharifi F, Zanjari N, Ghasemi S, survey of the health status indicators in elderly of Tehran, Journal of Diabetes and Metabolism 2012;13(1):50-61 [persian].
- 19.Nejati V, Assessing the health status of elderly people in the province of Qom, JQUMS, 2007; 13(1): 67-72 [persian].
- 20.Macdonald JA, Morris DL, Preechawong S, Chang HJ, Reports on depressive symptoms in older adult swith chronic conditions, Journal of Theory Nursing Practice 2010; 18(2-3): 185-96.
- 21.Mobasher M, Moezzi M, The prevalence of depression among the elderly population of Shayestegan and Jahandidegan nursing home in Shahrekord, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 2010; 12(2): 89-94. [persian].
- 22.Khoshkonesh A, Cognitive effects of group counseling on anxiety and depression in the elderly female nursing home residents in the city of Sabzevar, Journal of Salmand 2009;14(8):14-24. [Persian].
- 23.karel MJ, Gatz M, Assessing and treating Late life depression, Journal of scientific research 2002;5(9):68-97.

- 24.Sohrabi B, Comparison of cognitive status and depression among elderly nursing home residents and residents of private homes, Journal of Danesh 2009;2(3):27-32. [persian].
- 25.Babak A ,Meratti M, Depression and its related factors in elderly Esfahan, Journal of Salmand 2008;14(7): 17-27 [Persian].
- 26.Lee SY, Tsai TI, Tsai YW, Health literacy, health status, and healthcare utilization of Taiwanese adults: results from a national survey, Journal of BMC Public Health 2010; 10: 614-9.
- 27.von Strauss E, Aguero-Torres H, Kareholt I, Women are more disabled in basic activities of daily living than men only in very advanced ages: A study on disability, morbidity and mortality from the Kungsholmen Project, Journal of Clin Epidemiology 2003; 56(7): 669-77.
- 28.Eftekhar Ardebili H, Khatti Deizabadi F, Batebi A, Shojaiezadeh D, Yazdani J, Frequency of Functional and Cognitive Impairment and Relevant Factors in Aging, Journal of Mazandran University of Medical Sciences 2012; 22(96): 115-25.
- 29.Beiranvand R, Shokoohi S, Babanejad M, Behzadifar M, Delpisheh A, Assessment of Health Status in Elderly of Ilam Province. Journal of Ilam University of Medical Sciences 2013;21(6):276-86.
- 30.Yaghmaie F, Activities of daily living: Introducing a new scale for activities of daily Living, Journal of Nursing and Midwifery 2004; 15: 3-12.
- 31.Nabavi SH, Shoja M, Mohammadi S, Rashedi V, Health-related quality of life in community-dwelling older adults of Bojnourd, 2014, Journal of North Khorasan University of Medical Sciences, 2014;6(2):433-439.
- 32.Rashedi V, Gharib M, Yazdani A, Social Participation and Mental Health among Older Adults in Iran, IRJ. 2014; 12 (19) :9-13

Health physical and mental status in the elderly of Kerman

Borhaninejad V¹, Momenabadi V², Hosseini SH³, Mansori T⁴, Sadeghi A⁵, toroski M⁶*

¹PHD Student in Gerontology, Researcher Infectious and Research Center for Tropical Disease, HSR Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

²MSc Student, Department of Health Services, School of Public Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

³M.Sc of Health Science, Vector-borne Diseases Research Center, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

⁴PHD Student in Gerontology, University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran.

⁵PHD Student in Health Management, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

⁶PHD Student in Pharma - Economics & Administrator, Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.

***Corresponding author:** Tehran University Of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Email:Mehditroski@gmail.com

Abstract

Background & Objectives: With increasing life expectancy, mean and median age of the population and the number and proportion of older people have increased. To plan for providing services to this population, access to accurate information is essential. The present study describes assessing physical and mental health status elderly in Kerman city that will provide appropriate evidences for planners.

Material & Methods: This was a cross-sectional study in which 400 elderly people were questioned in Kerman. Data collection was performed by standard questionnaires (ADL, SF36, Kessler-K6 and Yeild questionnaire). To analyze the data we used SPSS17 software, and statistical tests such as chi square, T test, and one way ANOVA were applied.

Results: More than half of the elderly had problems with depression and anxiety disorders. In psychological wellbeing, Loneliness was the most common complain of old people. The activities of daily living were found to be without any dependence in 56% of population and 30% with relative dependence and 14% with complete dependence. Also on Physical Performance 22% of elderly had severe restrictions, 35.2% had moderate restrictions and 36.2% had Low restrictions.

Conclusion: there are many problems for elderly. Therefore, more efforts are essential to modify these effects in order to protect their independence.

Keywords: Elderly, Activity of Daily Living (ADL), Physical Performance, Anxiety, depression.