

استرس و راهبردهای مقابله با آن در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

سلیمان حسن زاده^۱، میترا هاشمی^۲، مریم مدی نشاط^{۳*}

^۱دانشجوی رشته پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۲کارشناس ارشد آمار، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۳کارشناس ارشد روانپرستاری، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

*نویسنده مسئول: بجنورد، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد

پست الکترونیک: neshat_maryam@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: در شرایطی که دانشجویان پرستاری نمی‌توانند از عوامل استرس زا در محیط بالین اجتناب کنند حمایت و راهنمایی دانشجویان به منظور کاهش استرس اولویت مربیان بالینی پرستاری می‌باشد، لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان استرس و راهبردهای مقابله با استرس در آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، در سال ۱۳۹۲ انجام شد.

مواد و روش کار: این پژوهش یک مطالعه مقطعی - تحلیلی است. جامعه این پژوهش را ۱۱ نفر از دانشجویان رشته کارشناسی پرستاری تشکیل می‌دادند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استرس شغلی و پرسشنامه مقابله با موقعیت‌های استرس زا بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: از ۱۱ دانشجوی شرکت کننده در این پژوهش ۳۰/۹٪ مرد و ۶۹/۹٪ زن بودند. از حیطه مساله مدار، ۱۸/۵٪ از حیطه هیجان مدار، ۴/۹٪ حیطه اجتماعی، ۱۳/۶٪ حیطه حواس پرتی، ۲۴/۷٪ از حیطه مشغولیت اجتماعی استفاده می‌کرده اند. سطح استرس دانشجویان در حد $2/94 \pm 0/35$ بود. عوامل بیولوژیک ($3/8/3$ ٪)، بارکاری ($14/1$ ٪) بیشترین منبع استرس زا هستند. آزمون همبستگی پیرسون ارتباط مستقیم معناداری بین استرس شغلی و حیطه هیجان مدار از روش‌های مقابله با تنیش نشان داد ($P=0/021, r=0/244$).

نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری سطح متوسط را در نتیجه برخی عوامل بالینی تجربه می‌کنند. روش غالب در بین دانشجویان پرستاری در مقابله با استرس، سبک مساله مدار بوده است و حیطه اجتماعی کمترین کاربرد را دارد. یافته‌های این مطالعه به منظور تعیین نیازهای دانشجویان و ارتقاء یادگیری در محیط بالین تأثیر بسزایی دارد.

واژه‌های کلیدی: استرس، سبکهای مقابله ای، دانشجوی پرستاری

مقدمه

شده نشان می دهد دانشجویان پرستاری ممکن است مبتلا به اختلالات جسمانی و روانی شوند. بین عوامل استرس زا (دوری از خانواده، نگرانی از آینده شغلی، عدم رضایت از رشته تحصیلی و مشکلات مالی) و سلامت روان دانشجویان ارتباط وجود دارد به طوری که در مطالعه سلیمانی زاده و همکاران (۲۰۰۷) ۲۸٪ مشکوک به اختلالات روانی بودند [۱۳]. دانشگاه پزشکی مصر (۲۰۱۱) شیوع سطح بالای استرس، اضطراب و افسردگی را به ترتیب با ۴۰/۲٪، ۴۶/۶٪ و ۲۷/۹٪ نمره شاخص کلی بیماری ۶/۷ \pm ۲۸/۶ \pm ۱۵-۸۹ را در میان دانشجویان پرستاری گزارش می کند [۱۴]. مروری بر مطالعات نشان می دهد علائم جسمی و روانی ناشی از استرس در دانشجویان پرستاری بیش از دانشجویان سایر رشته ها است. برخی علائم جسمی مرتبط با استرس عبارتند از: لرز، تعریق، ضعف جسمانی، کمر درد، تغییرات سطح ایمونوگلوبولین، افزایش ترشح کورتیزول و کاهش ایمنی در مقابل بیماریها و برخی علائم روانی شامل: هراس، اضطراب، تنہایی، انصراف، غمگینی، فرسودگی، درماندگی با منابع ایجاد استرس در دانشجویان پرستاری مرتبط هستند. البته اضطراب مهمترین علامتی است که در بین همه تظاهرات استرس توسط دانشجویان گزارش می شود [۱۵]. در شرایطی که عوامل استرس زا سلامت و عملکرد تحصیلی دانشجویان پرستاری را تحت تاثیر قرار می دهد آنها تلاش می کنند با استفاده از روشهای سالم یا ناسالم مختلف آرامش و تعادل خود را حفظ نمایند. تطابق با استرس یک فرایند پویا و مداوم است که به رشد، بقاء، حفظ و تمامیت اشخاص کمک می کند [۱۶]. مطالعه کلاینی یوباس^۳ و همکاران (۲۰۱۳) در تایلند بین دانشجویان پرستاری نشان می دهد نوعی تطابق با استرس توسط دانشجویان گزارش شده است مخصوصاً ۷۷٪ از اختلالات جسمانی و ۱۱٪ استرس زا دانشجویان با استفاده از مکانیسم های تطبیقی کنترل می کنند [۱۷]. در مطالعه ولف^۴ و همکاران (۲۰۱۴) در مید وسترن^۵ دانشجویانی سال سوم و چهارم

مواجهه با موقعیت های استرس زا همیشه در آموزش پرستاری وجود دارد و دانشجویان پرستاری نمی توانند از عوامل استرس زا اجتناب کنند لذا توانایی تطابق با این استرس ها در کسب موقفيت های حرفه ای بسیار مهم است [۲،۱] شیوع استرس در حد متوسط تا زیاد [۴،۳] در بین دانشجویان پرستاری موجب می شود که زمان زیادی را برای غلبه بر عوامل استرس زا اختصاص دهند [۵] و به طرز چشمگیری در طیفی از تعارض تا تطابق پویا باشند [۶]. بررسی در میان دانشجویان پرستاری دانشگاه جوردن^۶ نشان می دهد عمدۀ ترین منابع استرس تکالیف دانشجویان و محیط بالین می باشد. در هندوستان دو سوم دانشجویان سطح لیسانس دارای سطح استرس متوسط تا شدید هستند. عوامل استرس زا عبارتند از: تکالیف و حجم کاری زیاد (۶۳/۳٪)، عوامل مربوط به همایش و زندگی روزمره (۴۵/۵٪) و محیط بالین (۴۰/۹٪) [۷]. همچنین در مطالعه ای پاراساد و همکاران (۲۰۱۳) سطح استرس ۵۱/۶٪ و سطح تطابق با استرس دانشجویان پرستاری سال اول در حد متوسط گزارش شد [۸]. در پاکستان مطالعه شمیلی و فیصل^۷ (۲۰۱۲) شایعترین منابع استرس برای دانشجویان را دروس تئوری، تجارب بالینی، محیط دانشکده و حیطه شخصی و اجتماعی بیان می کند [۹]. در عربستان ۷۰٪ دانشجویان پرستاری گزارش کرده اند که به کرات در ماه گذشته دچار استرس شده اند، ۶۰٪ این دانشجویان علت استرس را چیزهایی که خارج از کنترل آنها بوده و ۵۰٪ علت آن را موارد غیرمنتظره بیان کرده اند همچنین بین میزان استرس دانشجویان پرستاری و تجربه زندگی جدید ارتباط وجود دارد. برخی مطالعات نشان می دهند، تجربه زندگی جدید در دانشجویان سال دوم اثرات منفی بیشتری دارد [۱۱،۱۰]. پاسخ به استرس پیامدهای منفی مانند: افزایش موارد بیماری دانشجویان، کاهش احساس سلامتی، خوب بودن و افسردگی به دنبال دارد [۱۲]. اطلاعاتی که با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) جمع آوری

3 - Klainin-Yobas

4 -Wolf

5 - Midwestern

1 - Jordan University

2 -Shomail Faisal

قرارمی دهد. پایابی این آزمون به وسیله بدقی، ۱۳۸۷ با استفاده از روش بازارآزمایی درسطح رضایت بخشی محاسبه شده است (آلفای کرونباخ = ۰.۸۴٪) برای نمره گذاری پرسشنامه به عبارت هر زیر مقیاس به ترتیب برای هرگز نمره ۱، بندرت نمره ۲، بعضی اوقات نمره ۳، و همواره نمره ۵ تعلق می گیرد. میانگین نمرات هر زیر مقیاس بیانگر میزان استرس اندازه گیری شده هر زیر مقیاس است که دامنه تغییرات ۱ تا ۵ بوده و در آن ۱ حالت مطلوب (استرس ناچیز) و ۵ حالت نامطلوب (استرس شدید) است. کمترین امتیاز کسب شده ۳۵ و بیشترین نمره ۱۷۵ است نمره بالاتر نشان دهنده میزان استرس بیشتر است که فرد تجربه کرده است [۲۲]. پرسشنامه دوم مربوط به راهبردهای مقابله ای فرد در برابر استرس^۲ است که این پرسشنامه توسط اندرلر و پارکر (۱۹۹۰) تهیه شده و به وسیله اکبرزاده (۱۳۷۶) ترجمه شده است. این تست شامل ۴۸ ماده هست که پاسخها به روش لیکرت از هرگز CISS (۱) تا همیشه (۵) مشخص شده است. پرسشنامه سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله ای را در بر می گیرد:

۱- مقابله مساله مدار یا برخورد فعل با مسئله درجهت مدیریت و حل آن

۲- مقابله هیجان مدار یا تمرکز بر پاسخهای هیجانی به مسئله

۳- مقابله اجتنابی یا فرار از مسئله دامنه تغییرات سه نوع رفتار رویارویی به این شکل است که نمره ۱ هر یک از رفتارهای رویارویی سه گانه یعنی مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی از ۱۶ تا ۸۰ است به عبارتی شیوه ی رویارویی غالب فرد با توجه به نمره ای که درآزمون کسب می کند مشخص می شود یعنی هر کدام از رفتارها نمره ی بالاتری را کسب کند آن رفتار به عنوان شیوه رویارویی فرد در نظر گرفته می شود. برای به دست آوردن پایابی پرسشنامه سیکهای مقابله با استرس درگروه دانشجویان از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در مقابله مساله مدار پسران ۹۲٪ و دختران ۸۵٪ و هیجان مدار پسران ۸۲٪ و دختران ۸۵٪ و اجتنابی پسران ۸۵٪ و دختران ۸۲٪ به دست آمده است. ضریب اعتبار

رشته پرستاری که سابقه ای از افسردگی، اعتماد به نفس پایین و حمایت اجتماعی ضعیف دارند و از مکانیسم های تطبیقی هیجانی بیشتر استفاده می کنند به همین علت استرس بالایی را تجربه می کنند [۱۸]. در فلیپینو^۱ اکثر دانشجویان سال پایین پرستاری به روش هیجانی به استرس پاسخ می دهند به طوری که در آموزش بالینی احساس نگرانی، اضطراب، افسردگی و بدبوختی می کنند [۱۹]. از آنجایی که آموزش بالینی بخش ضروری از آموزش دانشجویان پرستاری است و هدف از آن ایجاد یکپارچگی بین تئوری و بالین و افزایش تفکر انتقادی و توانایی های تصمیم گیری می باشد. لذا آگاهی دانشجویان پرستاری از سطح استرس، منابع آن و نحوه واکنش به آن یک عامل مهم در تعیین و برنامه ریزی مداخلات موثر و راهبردهایی به منظور کاهش یا پیشگیری از استرس در آموزش پرستاری و تسهیل یادگیری هم در دانشکده و هم در بالین می باشد [۲۰، ۲۱]. این مطالعه با هدف تعیین سطح استرس و راههای مقابله با آن در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام شد.

روش کار

این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد. پس از تصویب این مطالعه توسط معاونت پژوهشی و کسب مجوز از ششمین کمیته اخلاق ۹۲/۱۰/۴ این پژوهش در دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد (مرکز استان خراسان شمالی) انجام شد. جامعه پژوهش ۱۳۸ نفر از دانشجویان پرستاری تشکیل می دادند که پس از شروع مطالعه از ۹۲/۱۰/۴ به مدت ۸ ماه، ۸۱ پرسشنامه عودت داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ای متشكل از دو بخش می باشد: پرسشنامه اول مربوط به سنجش عوامل استرس زا در محیط کاری (به خصوص در محیط بیمارستانی، درمانی) تدوین و طراحی شده است و مشتمل بر ۳۵ سوال است که ۱۰ زیر مقیاس گرانباری نقش، بی کفایتی نقش، ناسازگاری نقش، ابهام نقش، روابط با مافوق و همکار، نوبتکاری، عوامل فیزیکی، عوامل شیمیایی، عوامل بیولوژیکی و عوامل ارگونومیکی را مورد بررسی

اجتنابی، ۱۱ نفر ۱۳/۶٪ حیطه حواس پرتی، ۲۰ نفر ۷/۲۴٪ از حیطه مشغولیت اجتماعی، ۱ نفر ۱/۲٪ حیطه مساله مدار و هیجان مدار، ۱ نفر ۱/۲٪ حیطه مساله مدار و اجتنابی، ۱ نفر ۱/۲٪ حیطه مساله مدار و حواس پرتی، ۲ نفر ۲/۵٪ حیطه اجتنابی و حواس پرتی و ۱ نفر ۱/۲٪ حیطه اجتنابی، مشغولیت اجتماعی استفاده می کرده اند. ارتباط بین استرس و ابعاد مختلف روش های مقابله با استرس در جدول ۳ آمده است.

آزمون تی مستقل بین میزان استرس در دانشجویان دختر و پسر تفاوتی نشان نداد همچنین حیطه های راهبرد های مقابله با استرس در بین دانشجویان دختر و پسر تفاوتی نداشت.

حیطه مساله مدار از روش های مقابله با تنیش با حیطه ناسازگاری و ابهام نقش، حیطه هیجان مدار با ناسازگاری و عوامل فیزیکی، حیطه اجتنابی با گرانباری و رابطه با موفق، حیطه حواس پرتی با گرانباری، ناسازگاری و روابط با همکار، حیطه مشغولیت اجتماعی با روابط با همکار ارتباط معنادار، نشان داد (حدوا . ۳)

برای تحلیل داده ها و تعیین چگونگی تاثیر راهبردهای مقابله با استرس بر استرس یعنی مشخص کردن اینکه چند درصد از واریانس استرس کلی به وسیله ابعاد راهبردهای مقابله‌ای تبیین می‌شود، از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد متغیرهای مساله مدار، هیجان مدار، اجتنابی، حواس پرتی و مشغولیت اجتماعی به عنوان متغیرهای پیش بین وارد و استرس دانشجویان به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شد نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ۶/۵٪ واریانس استرس به وسیله سبک هیجان مدار تبیین می‌

پرسشنامه با موقعیت های استرس زا ازطريق آلفای کرونباخ در پژوهش قریشی درسطح بالایی (۰/۸۱۳۳) به دست آمده است. روابی پرسشنامه مذکور نیز طی تحقیقاتی که در ایران انجام شده است ثابت گردیده است. به منظور محاسبه همبستگی پرسشنامه مقابله با استرس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده و این نتایج به دست آمده است: مساله مدار ۰/۵۸، هیجان مدار ۰/۵۵ اجتنابی [۰/۹۳-۲۳-۲۵].

یافته ها

یافته ای این پژوهش نشان می دهد از ۸۱ دانشجوی شرکت کننده در این پژوهش از $\% ۳۰/۹$ (۲۵ نفر) مرد و $\% ۶۹/۱$ (۵۶ نفر) زن بودند. ۷٪.۸۲ (۶۷ نفر) از دانشجویان مورد مطالعه مجرد و $\% ۱۷/۳$ (۱۴ نفر) متاهل بودند. ۱۳٪ نفر $\% ۴۶/۹$ (۳۸ نفر) دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۹ را داشتند و $\% ۳۷$ (۳۰ نفر) ورودی سال ۱۳۹۱ بودند همچنین شیفت کاری اکثر دانشجویان صبح بود.

جدول ۱ نشان می دهد در میان ابعاد مختلف استرس شغلی عوامل بیولوژیک در بین ۳۱ نفر $\frac{۳۸}{۳}\%$ و بارکاری در بین ۱۲ نفر $\frac{۱۴}{۸}\%$ و عوامل شیمیایی و بیولوژیکی در بین ۱۰ نفر $\frac{۱۲}{۳}\%$ دارای بیشترین نمره بودند. نمره استرس ۵۵ نفر از افراد مورد مطالعه در بازه ۲ تا ۳ و ۶ نفر ($\frac{۳۲}{۱}\%$) در بازه ۳ تا ۴ قرار داشتند و میانگین نمره استرس $\pm \frac{۳۵}{۹۴}$ بود. در میان ابعاد مختلف راهبردهای مقابله با استرس حیطه مساله مدار و مشغولیت اجتماعی بالاترین میانگین را داشتند (جدول ۲)، روش غالب در بین دانشجویان پرستاری در مقابله با استرس، سبک مساله مدار بود ۲۵ نفر $\frac{۳۰}{۹}\%$ از حیطه مساله مدار، ۱۵ نفر $\frac{۱۸}{۵}\%$ از حیطه هیجان مدار، ۴ نفر $\frac{۴}{۹}\%$ حیطه


جدول ۱: میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف استرس شغلی در دانشجویان

جدول ۲: میانگین و انحراف معیار ابعاد مختلف راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان

مساله	مشغولیت	اجتنابی	هیجان	حواس	پرتوی	مدار	اجتماعی	میانگین و انحراف معیار
۳±۰/۸۵	۳/ ۱±۰/۶۷	۳/۱±۰/۵۳	۳/۳۶±۰/۷۱	۳/۴±۰/۷				

جدول ۳: ارتباط بین حیطه های روشهای مقابله با تنفس و حیطه های استرس

متغیرها	فیزیکی	گرانباری	بی کفايتی	ناسازگاری	ابهام نقش	همکار	ثيمابي	بيولوژيكي	ارگونوميکي	نوبت كاري
مساله										r= / p= /
مدار										r= / p= /
هیجان										r= / p= /
مدار										r= / p= /
اجتنابي										r= / p= /
حواص										r= / p= /
پرتوی										r= / p= /
مشغوليت										r= / p= /
اجتماعي										r= / p= /



نمودار ۱: خط رگرسیون

استفاده می کنند [۲۷] در امارات متحده مطالعه گومث^۳ و همکاران [۲۸] در بین دانشجویان پرستاری نشان می دهد اکثریت آنها روش‌های مقابله با استرس ثابت را بکار می گیرند تکیه بر مذهب و دعا شایع ترین روش مقابله با استرس است البته سبک ترجیحی دانشجویان سال اول در برخورد با استرس هیجانی است. در هندوستان بر اساس مطالعه سینق^۴ و همکاران [۱۶]، نیمی از دانشجویان پرستاری در اغلب موقع از روش اجتنابی استفاده می کنند اما گاهی اوقات به ترتیب از سبک انتقال، مساله محور و خوش بینی نیز استفاده می نمایند. در مالزی اکثر دانشجویان مسلمان از سبک مواجهه با استرس شامل: دیدگاه ثابت، پذیرش استرس، برنامه ریزی و مذهب به جای سبک اجتناب از استرس شامل انکار، سرزنش خود، سوء مصرف الکل و مواد استفاده می کنند [۲۹]. از دیگر یافته های جالب این مطالعه کاربرد روش مشغولیت اجتماعی بعد از سبک مساله مدار است. به نظر می رسد ویژگیهای شخصیتی دانشجویان پرستاری بر انتخاب نوع سبک مقابله با استرس آنها در آموزش بالینی موثر است بطوریکه دانشجویانی که به حرفة پرستاری علاقمندند در انتخاب سبک مقابله با استرس با سایر دانشجویانی که به حرفة پرستاری علاقمند نیستند متفاوت است [۳۰]. مروری بر مطالعات نشان می دهد [۸، ۱۸] دانشجویان پرستاری قویا حمایت اجتماعی، حرفة ای (از جمله صحبت با خانواده، دوستان، سایر دانشجویان، مربیان و مشاوران) و داشتن تفکر ثابت به عنوان راهبرد مقابله با استرس گزارش می کنند. براساس نظریه لازاروس و فولکمن^۵ وقتی نیاز به تطابق با استرس باشد حمایت اجتماعی مثل یک بافر عمل می کند و تاثیرات منفی استرس بر سلامت فرد را خنثی می نماید [۳۱]. در تمام این مطالعات و مطالعه حاضر، خود گزارشی دانشجویان پرستاری از روش‌های مقابله با استرس نشان می دهد روش‌های گوناگونی برای مقابله با استرس وجود دارد. کاربرد این روشها توسط دانشجویان پرستاری با میزان اعتماد به نفس افراد و تاثیر عوامل محیطی و

شود ضریب رگرسیون $B = 0.128$ و سطح معناداری $p = 0.028$ همانطور که از نمودار ۱ مشهود است با افزایش نمرات حیطه هیجان مدار میزان استرس نیز افزایش می یابد، در مراحل بعدی هیچ یک از حیطه های روش های مقابله با تنیش در تبیین استرس معنادار نبودند.

بحث

یافته های این پژوهش نشان می دهد دانشجویان در بالین دارای سطح استرس متوسط هستند غالب ترین سبک مقابله با استرس در بین دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی روش مساله مدار و مشغولیت اجتماعی است و کمترین کاربرد مربوط سبک اجتنابی می باشد. همسو با یافته های این مطالعه نتایج سایر مطالعات [۲-۴، ۸-۱۰، ۱۶] نیز نشان می دهد دانشجویان پرستاری در محیط بالین تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی از جمله بیولوژیکی، گرانباری و عوامل فیزیکی در حیطه های مختلف از استرس متوسط تا بالا برخوردارند. نتایج پژوهش اینانلو و همکاران [۲۶] نیز شایع ترین سبک مورد استفاده مربوط روش حل مساله و کمترین آن مربوط به سبک اجتنابی است. در مطالعه شعبان^۱ و همکاران [۷] در بین دانشجویان جوردن^۲ بعد از حل مساله خوشبین بودن و تغییر توجه از مسائل استرس زا به مسائل دیگر بیان شده و سبک اجتنابی نیز کمترین کاربرد را دارد. در این مطالعات نشان داده شده که دانشجویان از روش‌های مختلف تطابق با استرس آگاهند و می دانند که سبک مساله محور می تواند تاثیرات ثابت بر روی منابع استرس بالینی، محیط دانشکده و زندگی اجتماعی داشته باشد. در هنگ کنگ دانشجویان پرستاری نیز از بین چهار روش مقابله با استرس (انتقال، خوش بین بودن، حل مساله و اجتنابی)، بیش از همه حل مساله را در برخورد با منابع استرس زا به کار می برد اما گزارش کرده اند که دانشجویان پرستاری سال بالا که استرس زیادی در مراقبت از بیماران دارند بیشتر از سبک مساله محور استفاده می کنند در حالی که همین دانشجویان در مقابله با استرس های زیادی که از سوی مربیان و پرسنل پرستاری دریافت می کنند احتمالاً از سبک اجتنابی

3 - Gomath

4 - Singh

5 - Lazarus & Folkman

1- Shaban

2- Jordan

برنتایج این مطالعه موثر باشد و قابل تعییم به کل جامعه نباشد. اما این مطالعه دارای نقاط قوتی هم می باشد از جمله بعد از حیطه مساله مدار، استفاده از حیطه مشغولیت اجتماعی در مقابله با منابع استرس زا از نظر دانشجویان پرستاری مهم است لذا نقش منابع حمایتی برای برنامه ریزی در آینده حرفه ای این دانشجویان اهمیت می یابد.

نتیجه گیری

دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در معرض انواعی از استرس ها در محیط بالین قرار دارند. با توجه به اینکه سبک مساله محور غالب ترین روش دانشجویان پرستاری برای مقابله با استرس است اما با افزایش استرس سبک هیجان محور غالب می شود. مهم است که مردمیان و پرستل بالینی با انواع منابع استرس زا و انعکاس آن بر سلامت جسم و روان دانشجویان آگاه باشند. نحوه برخورد با استرس عملکرد دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد و بر فرایند و کیفیت مراقبت از بیماران موثر است به منظور کاهش اثرات استرس توصیه می شود آموزش هایی با تمرکز بر بهبود مهارت های حل مساله انجام شود.

تشکر و قدردانی

این پژوهش به کد ۶۹۲۶/۹۲/پ با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی انجام گرفته است. ضمن قدردانی از حوزه معاونت پژوهشی، پژوهشگران برخود لازم می دانند از کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی بجنورد تشکر نمایند.

شخصی و جنس ارتباط دارد البته دیگر مطالعات مذهب، فرهنگ جامعه، گروههای اجتماعی، سن، ترم تحصیلی و نوع ایزار جمع آوری اطلاعات را هم در انتخاب نوع روش مقابله با استرس موثر می دانند به طوری که مذهب موجب می شود برای دانشجویان پرستاری مسلمان کاربرد روشهای مقابله ای مانند: سوء مصرف الکل، مواد مخدر یا دارو قدغن باشد [۳۲، ۲۹، ۸]. از دیگر یافته های جالب مطالعه حاضر این است با افزایش استرس تمایل دانشجویان به کاربرد سبک هیجانی بیشتر است به عبارتی سبک هیجان محور پیش بینی کننده استرس است. یافته های مطالعه جمینز- جیمنز^۱ و همکاران [۳۳] در بین ۲۰۰۸-۲۰۰۹ دانشجویان دانشکده پرستاری اسپانیا از نشان می دهد کاربرد سبک هیجان محور در محیط بالین به سلامت دانشجویان صدمه می زند، در حالیکه به نظر می رسد کاربرد سبک مساله محور تاثیرات بیولوژیکی کمتری بر سلامت دانشجویان پرستاری داشته باشد. اما نتایج مطالعات گیبونس^۲ و همکاران [۳۴] گزارش می کنند سبک اجتناب محور قوی ترین عامل پیش بینی کننده اختلال در سلامتی می باشد اما بر اساس آمار دقیقاً نمی توان بیان کرد که سبک انتخابی دانشجویان تضمین کننده سلامتی آنها باشد بلکه فقط می توان ارتباط روشهای مقابله با استرس و سلامت جسمی و روانی را توصیف کرد. اما براساس این پژوهش و سایر مطالعات [۳۵، ۲۷، ۹] حمایت اجتماعی کمک کننده است و بر نگرش دانشجویان برای انتخاب روش مقابله با استرس سودمند است. این مطالعه دارای محدودیتهایی است از بزرگترین محدودیتهای این مطالعه مقطعی بودن این پژوهش است لذا تغییر در کابرد روشهای تطبیقی توسط دانشجویان پرستاری مثلا براساس ترم تحصیلی ثبت نشده است، بنابراین لازم است مطالعه ای آینده نگر که سطح استرس و تغییرات الگویی روشهای تطبیقی با استرس را پیگیری می نماید انجام شود. دومین محدودیت این مطالعه مربوط به حجم کم نمونه شرکت کننده در این مطالعه است بنابراین مطالعه ای با تعداد شرکت کننده بیشتر باید انجام شود. بعلاوه عوامل فرهنگی ممکن است

1 - Jimenez-Jimenez

2 - Gibbons

References

1. Edwards D, Burnard P, Bennett K, Hebden U, A longitudinal study of stress and self-esteem in student nurses, *Nurse Educ Today* 2010 Jan;30(1):78-84.
2. Lambert VA, Lambert CE, Nurses' workplace stressors and coping strategies, *Indian J Palliat Care* 2008 June;14:38-44
3. Phuekphan p, Stressors and Coping Strategies among AU nursing student , International conference of christian university of Thailand, Bangkok, during 19-21 November 2009, Online : <http://www.nurse.au.edu>
4. Prasad C V, Suresh A, Thomas DK, Pritty M K, Beebi S, Multazim V, The level of stress and coping mechanism adopted by I Year B.Sc. nursing students, *Arch Med Health Sci* 2013Jun;1:19-23
5. Mirzaei T, Oskouie F, Rafii F , Nursing students' time management, reducing stress and gaining satisfaction: a grounded theory study. *Nurs Health Sci* 2012 Mar;14(1):46-51[Persian].
6. Jannati Y, Mohammadi R, Seyedfatemi N, Iranian clinical nurses' coping strategies for job stress, Iranian clinical nurses' coping strategies for job stress, *J Occup Health* 2011 Jan;53(2):123-9[Persian].
7. Shaban IA, Khater WA, Akhu-Zaheya LM, Undergraduate nursing students' stress sources and coping behaviours during their initial period of clinical training: a Jordanian perspective, *Nurse Educ Pract* 2012 Jul;12(4):204-9.
8. Seyedfatemi N, Tafreshi M, Hagani H, Experienced stressors and coping strategies among Iranian nursing students, *BMC Nurs* 2007 Nov;6(11):1-10
9. Shomail S, Faisal A, Stressors and coping strategies among Baccalaureate Nursing Students at Shifa College of Nursing Islamabad, Pakistan, *Int J Nurs Educ*; 2012 October, 4(Issue 2):193-197
10. Tayebi – Miyaneh Z, Shahrokhi A, Comparison of stressful factors in clinical practices of nursing students: Causes and solutions , *Res Med Educ* 2012 April ; 4 (1) :26-33[Persian].
11. Eswi AS, Radi S, Youssri H, Stress/ Stressors as Perceived by Baccalaureate Saudi Nursing Students. *Middle-East J Sci Res* 2013 April;14 (issue 2): 193-202
12. Chipas A, Cordrey D, Floyd D, Grubbs L, Miller S, Tyre B. Stress: perceptions, manifestations, and coping mechanisms of student registered nurse anesthetists, *AANA J* 2012 Aug;80(4 Suppl):S49-55
13. Solaimanizadeh L, Solaimanizadeh F, Javadi M, Abasszadeh A, Association Between Mental Health and Educational Stressful Factors Among Students of Razi Nursing and Midwifery School in Kerman , *Iran J Med Educ* 2011 September; 11 (3) :200-209[Persian].
14. Amr A, El-Gilany AH, El-Moafee H, Salama L, Jimenez C, Stress among Mansoura (Egypt) baccalaureate nursing students, *Pan Afr Med J* 2011 Mar ;8(26): 1-9
15. Benavente SBT, Costa ALS, Physiological and emotional responses to stress in nursing students: an integrative review of scientific literature, *Acta paul enferm* 2011;24(4): 571-576
16. Singh C, Sharma S, Kumar Sharma R, Level of stress and coping strategies used by nursing interns, *Nurs Midwifery Res J* 2011 October;7(4):152-160
17. Klainin-Yobas P, Keawkerd O, Pumpuang W, Thunyadee C, Thanoi W, He HG, The mediating effects of coping on the stress and health relationships among nursing students: a structural equation modelling approach, *J Adv Nurs* 2014June ;70(Issue 6):1287–1298
18. Wolf L, Stidham AW, Ross R. Predictors of Stress and Coping Strategies of US Accelerated vs. Generic Baccalaureate Nursing Students: An embedded mixed methods study, *Nurse Educ Today* 2015 Jan;35(1):201-205
19. Labrague LG, Stress, Stressors, and Stress Responses of Student Nurses in a Government Nursing School, *Health Science Journal* 2013 October; 7(4):424 - 435
20. Lim CC, Chua TL, Creedy DK , Chan, M. F, Preliminary study of stress in undergraduate nursing students in Singapore, *Asia-Pacific Psychiatry* 2009 October; 1(Issue2): 74–80.
21. Nelwati, McKenna L, Plummer V, Indonesian student nurses' perceptions of stress in clinical learning: A phenomenological study, *Journal of Nursing Education and Practice* 2013 May, 3(5), 56-65
22. Bahrami A, Akbari H, Mousavi GA, Hannani M, Ramezani Y, Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals. *Feyz* 2012 Winter; 15(4): 366-373[Persian].

- 23.Inanloo M, Baha R, Seyedfatemi N, Hosseini A, Stress Coping Styles among Nursing Students, Hayat 2012 Jul ; 18 (3) :66-75[Persian].
- 24.Shokri O, Taghiloo S, Gravand F ,“ et al”, Factor structure and psychometric properties of the Persian version of the questionnaire dealing with stressful situations , Adv Cogn Sci 2008; 10 (3) :22-33[Persian].
- 25.Vaezfar S, Azadi M, Akbari Balootbangan A, Rahimi M, The Role of Coping styles and Self-efficacy in Nurses Job Stress in Hospital, IJPN 2014 September; 2 (2) :22-32[Persian].
- 26.Inanloo M, Baha R, Seyedfatemi N, Hosseini AF,Stress Coping Styles among Nursing Students, Hayat 2012 Jul;18(3): 66-75[Persian].
- 27.Chan CK, So WK, Fong DY, Hong Kong baccalaureate nursing students' stress and their coping strategies in clinical practice, J Prof Nurs 2009 Sep-Oct;25(5):307-313.
- 28.Gomathi KG, Ahmed S, Sreedharan J, Causes of Stress and Coping Strategies Adopted by Undergraduate Health Professions Students in a University in the United Arab Emirates, Sultan Qaboos Univ Med J 2013 Aug;13(3):437-41.
- 29.Al-Dubai SAR, Al-Naggar RA, Alshagga MA, Rampal KG, Stress and Coping Strategies of Students in a Medical Faculty in Malaysia, Malays J Med Sci 2011 Jul-Sep; 18(3): 57–64.
30. HassanII, HamzahR, Bahari MS(2011).Clinical practices among nursing students: Stressors and coping strategies,Online: <http://www.amazon.com>[Persian].
- 31.Lazarus RS & Folkman S (1984) Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York, NY.
- 32.Ni CH, Lo D, Liu X, Yang Q, Chinese female nursing students' coping strategies, self-esteem and related factors in different years of school, J Nurs Educ Pract 2012 November; 2(4):33-41
- 33.Jimenez-Jimenez C, Sanchez-Laguna J L, Jimenez-Linde IM, Coping and health in novice and experienced nursing students during clinical practice: a descriptive, differential and correlational analysis, J Nurs Educ Pract 2013 July;3(13):152-164
- 34.Gibbons C, Dempster M, Moutray M, Stress, coping and satisfaction in nursing students, J Adv Nurs 2011 Mar;67(3):621-32
- 35.Ellawela YG, Fonseka P, Psychological distress, associated factors and coping strategies among female student nurses in the Nurses' Training School Galle, J College of Community Physicians of Sri Lanka2011;16(1):23–9

Stress and coping strategies in clinical education of nursing students of North Khorasan University of Medical Sciences

Hasnzadeh H¹, Hashemi M², MaddiNeshat M^{3*}

¹BSc in nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Nursing Student of research committee, North Khorasan University of Medical Science, Bojnurd, Iran

²M.S.c of statistic, Deputy of research and technology, North Khorasan University of Medical Science, Bojnurd, Iran

³M.S.c in Psychiatric Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Research Center for Addiction and Behavioral Sciences, North Khorasan University of Medical Science, Bojnurd, Iran

***Corresponding Author:** M.S.c in Psychiatric Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Research, Center for Addiction and Behavioral Sciences, North Khorasan University of Medical Science, Bojnurd, Iran

Email: neshat_maryam@yahoo.com

Abstract

Background and objective: Since nursing students cannot avoid stressors in clinical setting, supporting and guiding students to reduce stress is a priority for nursing educators. This study aimed to investigate stress and coping strategies in clinical education of nursing students of North Khorasan University of Medical Sciences in 2013.

Materials & Methods: This was an analytical cross-sectional study. Study population was 81nursing students. Data was collected using the questionnaires, including demographic, occupational stress, and coping with stressful situations. Data were analyzed using SPSS software.

Results: Of 81 participants, 30.9% (25 students) were male, and 69.1% (56 students) female. Based on existing domains, 30.9% were grouped in problem-solving, 18.5% in excitement-based, 4.9% in avoidance, 13.6% in distraction, 24.7% in social engagement. The mean of stress level was 2.94 ± 0.35 . The greatest sources of stress were biological agents (38.3%) and workload (14.8%). The Pearson correlation test showed a direct relationship between occupational stress and excitement in coping strategies ($r=0.244$, $p=0.028$).

Conclusion: Our findings indicated that nursing students experience a moderate level of clinical setting. Problem oriented style was the dominant strategy among nursing students in coping with stress, and avoidance had minimal application. The findings of this study have a considerable impact to determine the needs of students and enhance learning in clinical settings.

Keywords: Stress, coping strategies, nursing students.