

اثرات تراتوزنیک عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور (Verbascum cheiranthifolium) بر جنین موش سوری

مهران وطنچیان^{۱*}، امیر دلاور^۲، شبنم شاهسون^۳، حسین کمالی^۴

^۱ استادیار گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۲ کارشناس ارشد بافت و جنین شناسی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۳ استادیار گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۴ کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز تحقیقات ایمنی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^{*} نویسنده مسئول: بجنورد، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
 پست الکترونیک: vatanchian@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: گیاه گل ماهور از جمله گیاهان دارویی است که دارای خواص متعدد درمانی از جمله رفع دل درد، درمان سرماخوردگی و برونشیت، ضد تب، هموروئید و میگرن می باشد. لذا با توجه به مصرف عصاره این گیاه توسط ساکنین مناطق کوهستانی که به این گیاه دسترسی دارند و با توجه به عدم بررسی اثر تراتوزن احتمالی این گیاه در گذشته، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور با غلظت های مختلف در ایجاد ناهنجاری در جنین موش سوری انجام شده است.

مواد و روش کار: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سرموش سوری ماده بالغ پس از جفت گیری به صورت تصادفی به ۵ گروه (کنترل، فنی توئین و ۳ گروه مورد آزمایش) تقسیم شدند. به موش های باردار گروه های فنی توئین و مورد آزمایش، در روزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ بارداری عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بصورت داخل صفاقی تزریق گردید. دوز تزریق در گروه های ۳، ۴ و ۵ به ترتیب ۲/۲۵، ۳ و ۳/۷۵ گرم بر کیلوگرم بود. سپس در روز ۱۸ حاملگی جنین ها از طریق سزارین از رحم خارج شدند و ابتدا از نظر زنده، مرده و بازجذب مورد بررسی و سپس وزن و قد آنها به ترتیب توسط ترازوی دیجیتالی و کولیس اندازه گیری شد. سپس جهت بررسی ناهنجاری های ماکروسکوپی اسکلت، با استفاده از تکنیک دوگانه آلیزارین ردوالسین بلو، رنگ آمیزی گردیدند. داده های به دست آمده به کمک آزمون های ANOVA و مربع کای تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: وزن و قد جنین موش های دریافت کننده عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور کاهش قابل ملاحظه ای را نشان دادند. ناهنجاری های اسکلتی متعدد در گروه های دریافت کننده عصاره آبی مشاهده شد که از آن جمله می توان به انگشت اضافه، دنده اضافه، دنده بهم چسبیده، اسکولیوزیس، اسپاینایفدا، شکاف کام و استخوانی شدن ناقص جمجمه اشاره کرد.

نتیجه گیری: عصاره گیاه گل ماهور می تواند منجر به کاهش رشد و ایجاد ناهنجاری های مختلف در جنین شود و لذا لازم است مصرف این گیاه در دوران بارداری با احتیاط صورت گیرد.

واژه های کلیدی: تراتوزن، ناهنجاری اسکلتی، گل ماهور، موش سوری

مقدمه

احتمال ابتلا به بیماری در زنان در طول بارداری وجود دارد و احتمال نیاز به درمان بادردهای تجویزی برای محافظت از خود و جنین وجود دارد. در شرایط دیگر، ممکن است مادر باردار بدون آگاهی از باردار بودنش، به مصرف دارو بپردازد و یا در حالی که تحت درمان است قصد باردار شدن کند. برخی از زنان بارداری با این تصور که درمانهای طبیعی اختلال آفرین نیستند و عوارضی برای مادر و جنین در بر ندارند اقدام به خوددرمانی با ترکیبات گیاهی می کنند که می توانند باعث بروز نقایص زمان تولد شوند [۱].

نقایص مادرزادی می تواند ناشی از عوامل ارثی و محیطی باشد که یکی از مهمترین عوامل محیطی، استفاده از برخی داروها در دوران بارداری می باشد [۲،۳].

متابولیت های ثانویه گیاهی فراوانی شناخته شده اند که دارای اثرات سمی بر جنین می باشند و باعث بروز ضایعات بر جنین یا نوزاد می شوند. عوارض مصرف این گیاهان بر روی مادر ممکن است خفیف باشد؛ از قبیل کاهش موقتی یا جزیی در توانایی باروری و یا ممکن است شدید باشد؛ مانند سقط جنین یا نقص عضو شدید هنگام تولد که باعث مرده به دنیا آمدن جنین می شود. گیاهان شناخته شده ای که باعث نقص جنین در حیوانات می شوند، شامل گونه های مختلف از جنس های *Astragalus*، *Oxytropis*، *Nicotiana*، *Conium*، *Lupinus* و *Veratrum* می باشند. در بسیاری موارد نیز ترکیبات ثانویه باعث نقص جنین می شوند که شامل آلکالوئیدهای استروئیدی، کینولیزیدین و پیپریدین می باشند [۴].

گل ماهور یا خرگوشک با نام علمی *Verbascum cheiranthifolium* گیاه علفی دو ساله است که دارای گل های زرد رنگ و برگ ها با کرک های پنبه ای و دارای ساقه ضخیم به ارتفاع حدود ۲ متر می باشد که در زمین های بایر، جنگل ها و مزارع می روید. در نواحی کوهستانی نیز تا حد ۱۸۰ سانتی متری بالا می رود [۵]. در مناطق مختلف دنیا و ایران به نام های علف خرگوش، خرگوشک، گل ماهور و علف ماهور نامیده می شود و در کتب سنتی به نام های قلونس و بوسیر و آذان الدب، بریز، لبیده آورده شده است [۶]. به طور کلی گیاهان این جنس را

Molene و به انگلیسی Mullen و Lungwort و Torches می نامند. که از خانواده پروانه آسا هستند [۷]. بررسی پراکندگی این گیاه نشان می دهد که ۶۰ درصد از ۳۶۰ گونه موجود در جهان در ترکیه و ایران وجود دارد که سهم ایران حدود ۴۲ گونه می باشد [۸]. ترکیبات اصلی عصاره گیاه های وریاسکوم عبارتند از: فلاونوئیدها، ساپونین ها، ایریدوئیدها، فنیل اتانوئید گلیکوزید، مونوترپن گلوکوزید، استروئید، اسپرمن آلکالوئید، اسیدفنل، اسید چرب، تانن، کاروتن و غیره [۹]. همچنین گل های این گیاه دارای اسانسی به رنگ زرد روشن، رزین و لعاب فراوان است. دانه آن و گونه های مختلف دیگر، اثر سمی دارد و برای شکار ماهی استفاده می شود [۱۰]. از مهمترین خواص درمانی این گیاه می توان مواردی چون رفع دل درد، سرماخوردگی، برونشیت، تب، ضد هموروئید و میگرن را نام برد. کاربرد این گیاه در طب سنتی متنوع و به عنوان نرم کننده، خلط آور، معرق و به صورت غرغره در معالجه آسم قابل ذکر می باشد [۱۱]. همچنین گل های این گیاه اثر نرم کنندگی، ضد تشنج، معرق دارد و در طب عوام سابقا از گل های آن برای رفع تنگی نفس، بی اشتهایی، کم شدن مقدار ادرار استفاده می شده است. طبای قدیم آنرا بهترین نرم کننده ذکر نموده و در رفع بیماری های مجاری هاضمه، مجاری ادرار، اسهال های ساده و قولنج موثر می دانستند [۱۲].



تصویر ۱: گیاه گل ماهور (*Verbascum cheiranthifolium*)

عصاره اتانولی ریشه *V.thapsus* در انواع مدل بهبود زخم نشان داده که این عصاره باعث افزایش رسوب کلاژن در محل زخم و روند بهبودی آن می‌شود [۱۳].

تاثیر ساپونین، فلاونوئید و فنیل اتانوئید گل‌های *mullein* روی تکثیر خودبخودی لنفوسیت‌های طحال موش نشان داده شده است. *luteolin*، وریاسکوزید، وریاسکوساپونین و فورسیتوسید B موجود در گیاه مذکور دارای خاصیت سیتوتوکسیک و سرکوب سیستم ایمنی می‌باشد [۱۴].

همچنین این گیاه دارای اثراتی چون ضدانگل [۱۵، ۱۶] و ضدالتهاب، ضدسرفه، ضدتومور و درمان‌کنندگی مشکلات تنفسی [۱۷] و دارای خواص آنتی‌اکسیدانی [۱۸] می‌باشند.

لذا باتوجه به کاربرد نسبتاً وسیع گل ماهور در مناطق مختلف دنیا و ایران و با توجه به رویش این گیاه در استان خراسان شمالی و مصرف آن توسط ساکنین منطقه از یک سو و نبود اطلاعات مربوط به عوارض و خطرات مصرف عصاره این گیاه از سوی دیگر در این پژوهش در نظر است اثرات تراتوژنی عصاره آبی بخش‌های هوایی گیاه گل ماهور بر روی جنین موش سوری مورد مطالعه قرار گیرد.

روش کار

مشخصات گیاه و روش عصاره‌گیری: در این مطالعه اندام هوایی گیاه گل ماهور توسط پژوهشگر از مناطق کوهستانی اطراف شهرستان بجنورد در فصل رویش جمع‌آوری گردید و پس از تأیید متخصص گیاه‌شناس مرکز تحقیقات گیاه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با شماره ۳۸۳۸۳ (SUMH) هرباریوم شد.

بعد از خشک شدن گیاه در دمای اتاق، عصاره‌گیری به روش خیساندن به کمک آب مقطر دوبار تقطیر بمدت ۴۸ ساعت انجام شد. برای این منظور ۱۰۰۰ سی سی آب مقطر بر روی ۲۰۰ گرم پودر گیاه ریخته شد تا حدی که روی پودر را بپوشاند و ۴۸ ساعت بعد، پس از صاف کردن به کمک صافی، مجموعه به دستگاه روتاری جهت تغلیظ منتقل شد. در نهایت عصاره حاصله در حرارت ۴۰ درجه سانتی‌گراد خشک شد [۱۹].

تعیین LD50: در این بررسی عصاره آماده شده، به موش‌های سوری نر بالغ تزریق شد. تعیین دوز کشنده بر اساس روش استاندارد OECD-GLP انجام گردید [۲۰]. بر این

اساس در این مطالعه میزان LD50 عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور ۸/۰۸ گرم بر کیلوگرم تعیین گردید. تعیین حداکثر دوز قابل تحمل (MTD): جهت تعیین حداکثر دوز قابل تحمل دوزهای ۵، ۳، ۲ گرم بر کیلوگرم به گروه‌های ۵ تایی موش سوری نر بالغ بر اساس روش استاندارد OECD-GLP تزریق گردید. بر این اساس میزان حداکثر دوز قابل تحمل ۳ گرم بر کیلوگرم تعیین گردید و معیار دوز تزریق به گروه‌های آزمایش قرار گرفت [۲۰].

حیوانات مورد آزمایش و شرایط نگهداری حیوانات: جهت انجام این مطالعه، موش‌های سوری از نژاد Balb/c از مرکز تحقیقات رازی مشهد خریداری و پس از انتقال به حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی بجنورد تحت شرایط ثابت ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و دمای مناسب ۱۷ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند و درجه حرارت حیوان‌خانه در تمام مدت ثابت نگه‌داری شد. غذای مورد استفاده آنها، غذای فشرده و آماده ساخت کارخانه خوراک دام پارس و آب مصرفی، آب تصفیه شده شهری بود که در ظروف آب‌خوری از جنس پلی‌اتیلن در دسترس حیوان قرار می‌گرفت. گروه‌های مورد مطالعه: تعداد ۵۰ سر موش ماده پس از طی دوره نگهداری و تطابق با محیط جدید، در اولین ساعات دوره روشنایی و روز هشتم نگه‌داری هر ۳ سر موش ماده با یک موش نر در یک قفس قرار داده شدند. سپس به طور مرتب موش‌ها در ساعت ۶ صبح از نظر پلاک واژینال بررسی شدند. زمان مشاهده پلاک واژینال روز صفر حاملگی در نظر گرفته شد و کلیه موش‌های باردار در قفس‌های دیگری نگه‌داری شدند. موش‌های باردار به طور تصادفی به ۵ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند:

گروه ۱: (کنترل) که هیچ‌گونه دارویی دریافت نمی‌کردند.
گروه ۲: (فنی‌توئین) که دوز ۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم فنی‌توئین را در روزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ بارداری به صورت داخل صفاقی دریافت کردند [۲۱].

گروه ۳، ۴، ۵: که به‌ترتیب دوزهای ۲/۲۵، ۳ و ۳/۷۵ گرم بر کیلوگرم را در روزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. در روز ۱۸ بارداری کلیه موش‌های باردار بیهوش شدند و با شکافتن جدار قدامی شکمی،

یافته‌ها

یافته‌های تأثیر عصاره‌ی آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بر میزان زنده ماندن و بازجذب جنین‌ها: در این مطالعه جمعا ۱۵۰ عدد جنین از گروه های کنترل، فنی توئین و گروه‌های آزمایش بدست آمد. سپس جنین‌ها از نظر ماکروسکوپی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. از ۵۲ عدد جنین در گروه کنترل همگی زنده و متحرک بودند. در گروه فنی توئین از ۳۸ عدد جنین ۲ مورد جذب شدگی (۵/۳ درصد) را نشان دادند و در گروه ۳، ۴ و ۵ به ترتیب ۷۱/۴۲، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد جذب شدگی مشاهده گردید.

یافته‌های تأثیر عصاره‌ی آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بر قد، وزن جنین‌ها و وزن رحم حاوی جنین: یافته‌های بدست آمده از بررسی اندازه طول سری-نشیمگاهی و توزین جنین‌ها حاکی از آن است که تزریق عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور سبب کاهش معنی دار اندازه و وزن جنین‌های زنده مانده در گروه ۳ در مقایسه با گروه کنترل می‌شود (جدول ۱) ($P < 0.05$).

توزین رحم‌های حاوی جنین در گروه‌های ۵ گانه نشان داد که با تزریق عصاره گیاه، وزن رحم حاوی جنین از $18/4 \pm 4/2$ گرم در گروه کنترل به ترتیب در گروه‌های ۳ و ۴ و ۵ به $4/65 \pm 3/56$ ، $1/41 \pm 0/28$ و $0/84 \pm 0/13$ گرم کاهش یافت که با $P < 0.05$ معنی دار می‌باشد.

جنین‌ها از لوله رحمی خارج شده و سپس در سرم فیزیولوژی قرار گرفتند. جنین‌ها با ترازوی حساس دیجیتالی (مدل DENVER) توزین شدند و قد از فرق سر تا نشیمنگاه با استفاده از کولیس اندازه‌گیری و از نظر ناهنجاری‌های قابل مشاهده بررسی گردیدند. پس از رنگ آمیزی آلزارین رد و آلسین بلو کلیه ناهنجاری‌های اسکلتی به وسیله استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند.

رنگ آمیزی اسکلت :

۱. پس از کندن پوست و در آوردن احشا به مدت ۳ روز در الکل ۷۰٪ قرار می‌گیرد.
 ۲. رنگ آمیزی غضروف با آلسین بلو بمدت ۳ روز
 ۳. اتانول ۹۵ بمدت ۶ ساعت
 ۴. پتاس ۲٪ بمدت ۲۴-۱۲ ساعت
 ۵. رنگ آمیزی استخوان با آلزارین رد بمدت ۲ روز
 ۶. محلول یک به یک پتاس ۱٪ و گلیسرول ۲۰٪ به مدت ۲۴ ساعت
 ۷. محلول ۱ به ۱ گلیسرول خالص بمدت ۲۴ ساعت
- این رنگ آمیزی برای تشخیص قسمت‌های غضروفی و استخوانی و نیز مراکز استخوان سازی و نیز تخمین غضروف نسبت به استخوان مفید می‌باشد [۲۳، ۲۲].
- داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS نسخه ۲۰) و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون مربع کای و آزمون دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده‌ها به صورت میانگین، انحراف معیار و فراوانی توصیف شدند.

گروه کنترل و آزمایش					شاخص	متغیر
گروه ۵	گروه ۴	گروه ۳	فنی توئین	کنترل	تعداد	کل جنین‌ها
۲۶	۲۰	۱۴	۳۸	۵۲		وزن جنین‌ها (gr)
-	-	$0/97 \pm 0/19$	$0/87 \pm 0/16$	$1/26 \pm 0/2$	Mean±SD	
-	-	$17/15 \pm 0/83$	$18/34 \pm 2$	$26/17 \pm 2/03$	Mean±SD	قد جنین‌ها (mm)
$0/84 \pm 0/13$	$1/41 \pm 0/28$	$4/65 \pm 3/56$	$12/4 \pm 1/6$	$18/4 \pm 4/2$	Mean±SD	وزن رحم و جنین (gr)

جدول ۱: مقایسه وزن رحم موش‌های باردار و قد و وزن جنین موش‌های مورد مطالعه در گروه‌های مختلف (داده‌ها به صورت انحراف معیار \pm میانگین می‌باشد. گروه‌های آزمایش به ترتیب دوزهای ۲/۲۵، ۳ و ۳/۷۵ گرم بر کیلوگرم از عصاره بخش هوایی گیاه گل ماهور را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند).

گروه کنترل و آزمایش					شاخص	متغیر
کنترل	فنی توئین	گروه ۳	گروه ۴	گروه ۵		
۵۲	۳۸	۱۴	۲۰	۲۶	تعداد(درصد)	کل جنین ها
۵۲	۳۶ (۹۴/۷)	۴ (۲۸/۵۷)	۰	۰	تعداد(درصد)	جنین های زنده
(۱۰۰)						
۰	۲ (۵/۳)	۱۰ (۷۱/۴۲)***	۰	۰	تعداد(درصد)	جنین های جذب شده
۰	۳ (۷/۹)	۱ (۷/۱۴)*	۰	۰	تعداد(درصد)	شکاف کام
۰	۵ (۱۳/۲)	۱۴ (۱۰۰)***	۰	۰	تعداد(درصد)	اسپاینابیفیدا
۰	۴ (۱۰/۵)	۱ (۷/۱۴)*	۰	۰	تعداد(درصد)	دنده اضافه
۰	۱۰ (۲۶/۳)	۲ (۱۴/۲۸)*	۰	۰	تعداد(درصد)	دنده بهم چسبیده
۰	۳۱ (۸۱/۶)	۱۴ (۱۰۰)***	۰	۰	تعداد(درصد)	انگشت اضافه
۰	۳۵ (۹۲/۱)	۱۴ (۱۰۰)***	۰	۰	تعداد(درصد)	استخوانی شدن ناقص
						جمع
۰	۴ (۱۰/۵)	۳ (۲۱/۴۲)*	۰	۰	تعداد(درصد)	اسکولیوزیس

جدول ۲: مقایسه انواع آنومالی مشاهده شده در جنین موش های مورد مطالعه در گروه های مختلف (گروه های مورد آزمایش به ترتیب دوزهای ۲/۲۵، ۳ و ۳/۷۵ گرم بر کیلوگرم از عصاره بخش هوایی گیاه گل ماهور را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند) ($P < 0.05$ ، $P < 0.01$ ، $P < 0.001$).

عصاره آبی بخش هوایی با دوز پایین (گروه ۳ آزمایش) ۱۰۰ درصد فراوانی را نشان دادند. از نظر ناهنجاری شکاف کام در گروه دریافت کننده عصاره آبی بخش هوایی با دوز پایین (گروه ۳ آزمایش) ۷/۱۴ درصد فراوانی مشاهده گردید. میزان بروز اسکولیوزیس در گروه دریافت کننده عصاره آبی بخش هوایی با دوز پایین (گروه ۳ آزمایش) ۲۱/۴۲ درصد ثبت گردید (جدول ۲).

بحث

نتایج بررسی اثرات تراتوژنیک عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بر روی رشد و نمو جنین موش سوری، نشان داد که عصاره آبی این گیاه حاوی ترکیباتی است که می تواند به شدت بر رشد طبیعی جنین و شاخص های امبریومورفومتريک و امبریولوژیک تاثیر گذارد. اثرات عصاره وابسته به دوز است به نحوی که با افزایش دوز شدت اثرات تراتولوژیک افزایش می یابد. بنحویکه در برخی از گروه های دریافت کننده دوزهای متوسط و بالای عصاره آبی گیاه گل ماهور، به میزان ۱۰۰ درصد جذب شدگی

یافته های تاثیر عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور بر مورفولوژی جنین ها از نظر بروز انواع آنومالی ها: در بررسی مورفولوژی جنین های بدست آمده از گروه فنی توئین و گروه ۳ (دوز پایین عصاره آبی بخش هوایی گیاه گل ماهور)، ناهنجاری های اسکلتی شامل ناهنجاری های دنده ای، اسپاینابیفیدا، اسکولیوزیس، انگشت اضافه و استخوانی شدن ناقص جمجمه در تعدادی از جنین های زنده مانده مشاهده گردید (جدول ۲). کلیه جنین های بدست آمده از گروه های دریافت کننده عصاره آبی بخش هوایی از نظر استخوانی شدن و تکمیل قوس مهره ها و جمجمه دچار نقص و عدم تکامل بودند که بطور معنی داری با گروه کنترل متفاوت است ($P < 0.05$). در گروه ۳، به میزان ۱۴/۲۸ درصد فراوانی دنده به هم چسبیده مشاهده گردید. از نظر دنده اضافه گروه دریافت کننده فنی توئین و گروه ۳ به ترتیب ۱۰/۵ و ۷/۱۴ درصد فراوانی را نشان دادند. از نظر آنومالی انگشت اضافه و اسپاینابیفیدا و نیز استخوانی شدن ناقص جمجمه، تمام جنین های دریافت کننده

جنینی مشاهده گردید و هیچیک از جنین ها زنده نماندند. بر اساس نتایج بدست آمده طول سری دمی جنین هایی که عصاره آبی را دریافت کردند کاهش می یابد که این کاهش در گروه ۳ اختلاف معنی داری را با گروه کنترل نشان می دهد ($P < 0.05$). این احتمال وجود دارد که کاهش طول سری دمی دیده شده در جنین های گروه مورد آزمایش به دلیل وجود آلکالوئیدهای موجود در گیاه گل ماهور باشد [۲۴]، زیرا یافته های حاصل از بررسی بر روی ترکیبات آلکالوئید، مثل بربرین میوه زرشک، حاکی از آن است. بربرین یک کاتیون آلی است که از غشا به آسانی رد شده و با مولکول DNA تشکیل کمپلکس می دهد و باعث تغییرات ساختمانی در DNA می شود و منجر به تغییر اعمال تنظیمی ژن ها گشته و در مسیر تمایز، اختلال ایجاد می کند [۲۵، ۲۶].

آلکالوئیدها سبب مهار دریافت اکسیژن توسط سلول می گردد و مهار کامل دریافت اکسیژن باعث مرگ سلولی و توقف رشد و یا کاهش رشد جنین ها خواهد شد [۲۷]. وزن و طول جنین، مهمترین پارامتر در بررسی اثر تراژن ها هستند و کاهش و افزایش وزن و طول بدن جنین با ژن های موجود در هر فرد مرتبط است [۲۸]. مصرف چربی برای تولید پروژسترون که برای لانه گزینی و تشکیل جنین اولیه لازم بوده ضروری است. اندازه و وزن جنین هایی که از یک کیسه رحم با تعداد کمی لانه گزینی به دست آمده اند نسبت به جنین هایی که در رحم با لانه گزینی بیشتر هستند بالاتر است که این موضوع مرتبط با تغذیه جنین است. تعداد لانه گزینی کم در رحم منجر به دریافت غذای بیشتر توسط جنین و افزایش وزن و طول بالا خواهد شد [۲۹].

مرگ جنین در این مطالعه که در گروه ۳، ۴ و ۵ بترتیب ۷۱/۴۲، ۱۰۰ و ۱۰۰ درصد جذب شدگی را نشان داد بر اساس اختلال در فرآیند تقسیم و تمایز سلولی ایجاد می شود به طوری که جنین نمی تواند زنده بماند، علاوه بر در صورت زنده ماندن، جنین نمی تواند در رحم مادر رشد و نمو را به پایان برساند و با اندازه ای کوچکتر در مقایسه با جنین های عادی، متولد می شوند [۳۰].

هورمون پروژسترون برای حفظ بارداری و لانه گزینی جنین ضروری است و کاهش آن منجر به کاهش رشد و

جذب شدن جنین می شود. همچنین با بررسی انجام گرفته، مشخص شده است که ساپونین ها می توانند منجر به کاهش ترشح این هورمون از جسم زرد شوند [۳۱]. از سوی دیگر ساپونین دارای خاصیت سقط زایی، ضدزایگوت و خاصیت ضد لانه گزینی [۳۲] و دارای اثر تراژونی بوده و باعث سقط یا مرگ جنین در خرگوش و موش ها می شود [۳۳]. همچنین این ترکیب سبب افزایش انقباضات رحم می شود [۳۴]. لذا با در نظر گرفتن مجموعه اثرات ضدجنینی ساپونین موجود در عصاره گیاه گل ماهور، می توان کاهش رشد و جذب شدن جنین ها را به وجود این ترکیبات در عصاره گیاه نسبت داد [۳۵].

کاهش غلظت پروژسترون در موش تا ۲۰٪ حد طبیعی، هیچ گونه اثری بر بقای جنین و رشد جنین یا جفت ندارد [۳۶]. با این تفاسیر می توان اینطور استنباط کرد که گیاه گل ماهور به دلیل وجود ترکیبات فلاونوئیدی، باعث تغییرات قابل توجهی در سطح عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-گناد می شود.

بنظر می رسد کاهش میزان پروژسترون توسط گیاه گل ماهور بیش از ۲۰٪ بوده که این امر منجر به عدم توانایی حفظ جنین و جذب آن می شود. از طرفی بعد از روز ۱۱ بارداری، پروژسترون به تنهایی قادر به حفظ بارداری نیست، بلکه به مقادیر کم استرادیول نیز نیاز می باشد. نیاز به استرادیول در روز ۱۱ حاملگی آغاز می شود و حداقل ۳-۴ روز طول می کشد [۳۷]. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر، تزریق عصاره در روزهای ۶-۱۴ (به صورت یک روز در میان) بارداری صورت گرفته است و متابولیسم گیاه به کندی در بدن صورت می گیرد و از آنجایی که از روز ۱۱ بارداری استرادیول نیز جهت حفظ بارداری لازم است، احتمالاً این گیاه توانسته است با تأثیری که بر عملکرد محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و گناد می گذارد، منجر به کاهش استرادیول شود.

آنزیم هیستون د-استیلاز (HDAC) در تنظیم بیان ژن های بازسازی کروماتین به خصوص در غضروف پیش هایپرتروفی نقش دارد [۳۸] و می تواند منجر به قطع تکثیر، تمایز و آپوپتوز شود [۳۹]. فعالیت این آنزیم برای رشد و نمو جنین بسیار مهم است که حذف آنزیم هیستون د-استیلاز (HDAC) در اوایل رشد منجر به

جنین موش سوری بیان می‌کند. فلاونوئیدها پس از تزریق به سرعت در خون و سراسر بدن پخش می‌شوند؛ به نحوی که ۳۰ دقیقه پس از تزریق این ترکیب به صورت داخل صفاقی به موش صحرایی، در پلاسما قابل ردیابی می‌باشد [۵۴].

همچنین مشخص شد که فلاونوئیدها متابولیسمی آرام داشته و فاز جذب و دفع این ماده آهسته صورت می‌گیرد و بنابراین احتمال انباشتگی فلاونوئیدها در بدن وجود دارد [۵۵]. همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته مشخص شده است که فلاونوئیدهایی که در طول دوره بارداری توسط مادر مصرف می‌شود می‌تواند باعث کلیواژ DNA شوند [۵۶].

نتیجه گیری

نتایج کلی حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره‌ی آبی بخش هوایی گیاه گل‌ماهور اثرات تراتوژنیک واضح و مشخصی بر جنین موش سوری از خود برجای می‌گذارد. وزن و قد جنین موش‌های دریافت کننده عصاره گیاه، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهند. ضمناً ناهنجاری‌های اسکلتی متعددی در گروه‌های دریافت کننده عصاره آبی مشاهده شد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به انگشت اضافه، دنده اضافه، شکاف کام و استخوانی شدن ناقص جمجمه اسپینایفیدا، شکاف کام و استخوانی شدن ناقص جمجمه اشاره کرد که به وضوح نشان دهنده اثرات تراتوژنیک عصاره‌ی آبی گیاه گل‌ماهور در دوزهای تجویز شده می‌باشد. احتمالاً گیاه گل‌ماهور به علت دارا بودن ترکیباتی چون فلاونوئید و ساپونین وتانن باعث ایجاد ناهنجاری در جنین می‌شود. عصاره گیاه گل‌ماهور دارای خواص تراتوژن می‌باشد و باعث کاهش رشد و ایجاد آنومالی‌های مختلف می‌شود و لازم است مصرف این گیاه در دوران بارداری با احتیاط صورت گیرد.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر بخشی از نتایج بدست آمده از طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی می‌باشد (کد طرح تحقیقاتی ۹۲/۶۴۰/پ/مصوب مورخ ۹۲/۲/۳۰) که بدین وسیله نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام می‌دارند.

نقص و عقب ماندگی رشد جنین می‌شود [۴۰]. مطالعات حیوانی نشان داده که مهار این آنزیم منجر به ناهنجاری‌های اسکلتی [۴۱] و لوله عصبی [۴۲] می‌شود که ازمهمترین داروهای مهارکننده این آنزیم‌داروهای ضد باکتری هستند که سبب هیپراستیلیاسیون در سومیت‌ها می‌شوند [۴۳] و ساپونین که یکی از ترکیبات مهم گل‌ماهور بوده و خاصیت آنتی‌باکتریال آن نیز مشخص شده و به نظر می‌رسد که با مهار این آنزیم می‌تواند منجر به بروز طیفی از ناهنجاری‌ها شود [۴۴].

مسیر موالونات یک مسیر پیچیده با کلسترول به عنوان یک محصول ضروری می‌باشد و در بافت‌های جنینی، کلسترول برای الگوهای رشد طبیعی مورد نیاز است، سنتز هورمون‌های استروئیدی برای فعال شدن مورفوژن shh لازم و ضروری است [۴۵] و از آنجا که پروتئین shh به عنوان تنظیم کننده کلیدی رشد جنینی و الگودهی و شکل‌گیری ساختارهای جنینی عمل می‌کند، لذا مهار سنتز این پروتئین منجر به نقایص هنگام تولد می‌شوند [۴۶] و آنزیم هیدروکسی متیل گلوکاریل کوآنزیم A ردوکتاز (HMG COA) مهار کننده در مسیر موالونات است [۴۷] و از آنجا که ترکیبات ساپونین و اثر آنها بر روی کاهش کلسترول مشخص شده است [۴۸]، لذا ساپونین با کاهش کلسترول که یک ترکیب ضروری برای ساخت هورمون استروئیدی است می‌تواند منجر به ایجاد ناهنجاری شود. استرس اکسیداتیو یک عدم تعادل بین تولید انواع رادیکال‌های آزاد O_2 و سیستم بیولوژیک است [۴۹]. همچنین استرس اکسیداتیو با ایجاد تداخل در فاکتورهای رونویسی حساس به اکسیداسیون، بیان ژن را مختل می‌کند [۵۰]، لذا در طول دوران قبل از تولد، می‌تواند منجر به ایجاد نقایص و منجر به مرگ جنین در موارد شدید آن شود [۵۱].

در بررسی‌های انجام شده بر روی آلکالوئیدها نشان داده شده که این ترکیبات در چربی حلالیت بالایی داشته و به آسانی از غشای سلول عبور کرده و وارد سلول می‌شوند. این ترکیبات در کبد متابولیزه شده و ترکیبات اکسیدانت را می‌سازند [۵۲]. آلکالوئیدها یکی از ترکیبات گیاه گل‌ماهور بوده [۵۳] و لذا وجود این ترکیب در گل‌ماهور مصداقی روشن بر ایجاد ناهنجاری توسط این گیاه را در

References

1. Tesch B.J, Herbs commonly used by women: an evidence-based review, Am J Obstet Gynecol, 2003;188(5 Suppl):S44-55.
2. Parivar K, Embryogenesis, Tehran: Mobtakeran Publications; 1997:271-5 [persian].
3. Rahmani F, The teratogenic effects of lamotrigine on mouse fetus, J Reprod Inferti 2006 Spring;7(2):45-52.
4. Hajiakhondia A, Abdollahi M, Alielahi H, Abdolalizadeh P, Karimpour H, Memarian H, "et al", Plants known effects on embryonic development in animals, Med Purification, 2003 Summer; (49):56-62 [persian].
5. Zargari A, Medicinal plants, Tehran: Tehran Univ Pub; 1989. Vol.3P.527-8 [persian].
6. Mirhaidar H, Plant sciences, Tehran: Nashre Farhange Eslami ; 2005. Vol.4 P.418 [persian].
7. Hormozzadeh K, Knowledge of medicinal plants, Tehran: Ayizh; 2009. P.224 [persian].
8. Sharifnia F, Notes on the distribution and taxonomy of Verbascum in Iran, J Bot. 2007 Aug;31(1):30-32 [persian].
9. Tatli I, Akdemir Z, Chemical constituents of Verbascum L, Species, Fabad J Pharm Sci. 2004;29:93-107.
10. Gross KL, Werner PA, The biology of Canadian weeds: Verbascum thapsus and V. blattaria, Can J Plant Science, 1978;58:401-413.
11. Samsam Shariat H, Selection of medicinal plants, Esfahan: Mani Pub; 2007.
12. Murti K, Singh R, Paliwal D, Taya P, Divya, Sarita, Effects of Verbascum Thapsus L, on normal and dexamethasone suppressed wound healing, Pharm On, 2011;2:684-697.
13. Klimek B, Stepien H, Effect of some constituents of mullein on proliferation of rat splenocytes in vitro, European J Pharm Sci. 1994;2:123.
14. Jimenez C, Riguere R, Phenylethanoid glycosides in plants structure & biological activating, Natural Product Reports, 1994;591-606.
15. Ali N, Shah SW, Shah I, Ahmed G, Ghias M, Khan I, "et al", Anthelmintic and relaxant activities of Verbascum Thapsus mullein, BMC Comp Alter Med. 2012 [persian].
16. Tatli I, Akdemir Z, Traditional uses and biological activities of Verbascum species, Fabad J Pharm Sci. 2006;31:85-96.
17. Ucar A, Camper N, Biological activity of common mullein a medicinal plant, J Ethnopharm, 2002 June;82(2002):117-125
18. Shahat Emam S, Glycosides of Verbascum letourneuxii, Asch. and its antioxidant activity, Aus J Bas Appl Sci. 2010;4(10):5038-5050.
19. Samsam-Shariat H, [Extraction and isolation of medicinal plants, effective compound and evaluation and identification methods for them, Isfahan: Mani; 1992] [persian].
20. OECD Guideline for the testing of chemicals, Oct 2007.
21. Soysal H, Unur E, Duzler A, Karaca O, Ekin N, Effects of intraperitoneal administration of the phenytoin on the skeletal system of rat fetus, J Seizure, 2010 Dec;20(2011):187-193.
22. Kermanian F, Espand teratogenic effects on the skeletal system and the growth of mouse embryo stained with Alizarin, Iran J Anatom, 2002; 1(1): 35-9 [persian].
23. Ovchinnikov D, Alcian blue/alizarin red staining of cartilage and bone in mouse, Cold Spring Harb Protoc, 2009 Mar; 2009(3): pdb.prot5170.
24. Hussain H, Aziz S, Miana GA, "et al", Biochemical Systematics and Ecology, 2009, 37, 124-6 [persian].
25. Yuan Heng T, Jeanette F, Marnane William C, Antisecretory effects of berberin in rat ileum, American Journal of physiology, 1981; 241(3): 253-8
26. Sadeghifar F, Parivar K, Ayatollahi M, [Biological Effects of alcohol aqueous extract of barberry fruit (Berberis vulgaris) on the growth of mouse embryo], MSc Thesis, Tehran Teacher Training University, 1996 [persian].
27. Potopshii AL, Akishina TM, Shishka GV, Antimicrobial and antineoplastic properties of alkaloids of greater celandine and their thiophosphamide derivatives, Microbial ZH, 1975; 37(6): 755-9.

28. Wilson JG, 1973, Environment and birth defects, Academic Press, New York.
29. PKH, 2009, Causes of early embryonic death in cattle, Center for Animal Health, <http://www.vet-klinik.com>. [Indonesia]
30. Setyawati I, 2009, Morphology of fetal mice (*Mus musculus* L.) after administration of bitter leaf extract (*Andrographis paniculata* Nees, *J Biologi* 13 (2): 41-44. [Indonesia]
31. Tamura K, Honda H, Mimaki Y, Sashida Y & Kogo H (1997) Inhibitory effects of a new steroidal saponin, OSW-1, on ovarian function in rats, *British Journal of Pharmacology* 121, 1796–1802.
32. Stolzenberg SJ & Parkhurst RM (1976) Blastocidal and contraceptive actions by an extract and compounds from endod (*Phytolacca dodecandra*), *Contraception* 14, 39–51.
33. Tewary PV, Chaturvedi C & Pandey VB (1973) Antifertility activity of *Costus speciosus* Sm. *Indian Journal of pharmacology* 35, 114–115.
34. Dollahite JW, Shaver T & Camp BJ (1962) Injected saponins as abortifacients, *American Journal of Veterinary Research* 23, 1261–1263.
35. Butterweck V, Hegger M, Winterhoff H, Flavonoids of *St. John's wort* reduce HPA axis function in the rat, *Planta Med.* 2004 Oct; 70(10): 1008-11.
36. Elbaum DJ, Bender EM, Brown JM, Keyes PL, Serum progesterone in pregnant rats with entopic or in situ corpora luteal: correlation between amount of luteal tissue and progesterone concentration, *Biol Rep.* 1975 Dec; 13(5): 541-5.
37. Milligan SR, Cohen PE. Silastic implants for delivering physiological concentrations of progesterone to mice, *Reprod Fertil Dev.* 1994; 6(2): 235-9.
38. Johnstone RW, Histone-deacetylase inhibitors: novel drugs for the treatment of cancer, *Nat Rev Drug Discov* 2002;1:287–299.
39. Marks PA, Richon VM, Rifkind RA, Histone deacetylase inhibitors: inducers of differentiation or apoptosis of transformed cells, *J Natl Cancer Inst* 2000;92:1210–1216.
40. Lagger G, O'Carroll D, Rembold M, Khier H, Tischler J, Weitzer G, Schuettengruber B, Hauser C, Brunmeir R, Jenuwein T, " et al", Essential function of histone deacetylase 1 in proliferation control and CDK inhibitor repression, *EMBO J* 2002;21:2672–2681.
41. Menegola E, Di Renzo F, Broccia ML, Prudenziati M, Minucci S, Massa V, Giavini E, Inhibition of histone deacetylase activity on specific embryonic tissues as a new mechanism for teratogenicity, *Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol* 2005;74:392–398.
42. Eikel D, Lampen A, Nau H, Teratogenic effects mediated by inhibition of histone deacetylases: evidence from quantitative structure activity relationships of 20 valproic acid derivatives, *Chem Res Toxicol* 2006; 19:272–278.
43. Di Renzo F, Cappelletti G, Broccia ML, Giavini E, Menegola E, Boric acid inhibits embryonic histone deacetylases: a suggested mechanism to explain boric acid-related teratogenicity, *Toxicol Appl Pharmacol* 2007; 220:178–185.
44. Tatli I, Akdemir ZS, Antimicrobial and antimalarial activities of secondary metabolites from some Turkish *Verbascum* species, *FABAD J. Pharm.Sci.*, 30, 84-92, 2005.
45. Kelley RI, Herman GE, Inborn errors of sterol biosynthesis, *Annu Rev Genomics Hum Genet* 2001;2:299–341
46. Gofflot F, Hars C, Illien F, Chevy F, Wolf C, Picard JJ, Roux C, Molecular mechanisms underlying limb anomalies associated with cholesterol deficiency during gestation: implications of Hedgehog signaling, *Hum Mol Genet* 2003;12:1187–1198
47. Edison RJ, Muenke M, Mechanistic and epidemiologic considerations in the evaluation of adverse birth outcomes following gestational exposure to statins, *Am J Med Genet A* 2004;131:287–298.
48. Harwood HJ Jr, Chandler CE, Pellarin LD, Bangerter FW, Wilkins RW, Long CA, Cosgrove PG, Malinow MR, Marcetta CA, Pettini JL, Savoy YE & Mayne JT (1993) Pharmacologic consequences of cholesterol absorption inhibition: alteration in cholesterol metabolism and reduction in plasma cholesterol concentration induced by the synthetic saponin b-tigogenin cellobioside (CP-88818; tiqueside), *Journal of Lipid Research* 34,377–395
49. Kappus H, Overview of enzyme systems involved in bio-reduction of drugs and in redox cycling, *Biochem Pharmacol* 1986;35:1–6.

50. Shahrzaz S, Qazyani T, Iran Farma, (Textbook of drugs official Iran), Tehran: Teimoorzade Pub; 200; 608 [persian].
51. Hansen JM, Oxidative stress as a mechanism of teratogenesis, Birth Defects Res C Embryo Today 2006; 78: 293–307.
52. Zevin S, Gourlay SG, Benowitz NL, Clinical pharmacology of nicotine, Clinic Dermatol 1998; 16(5): 557 – 64
53. Youhnovski N, Dandarov K, Guggisberg A, Hesse M (1999): Macrocyclic spermine alcohols from Verbascum: Isolation, structure elucidation and synthesis of the (E/Z)-isomeric pairs (S)-verbasikrine/(S)-isoverbasikrine and (S)-verbamekrine/(S)-isoverbamekrine, Helv Chim Acta 82: 1185–1194.
54. Romanova D, Grancai D, Jozova B, Bozek P, Vachalkova A, Determination of apigenin in rat plasma by high-performance liquid chromatography, J Chromatogr A, 2000 Feb; 870(1-2): 463-7.
55. Gradplatto A, Basly JP, Berges R, Teyssier C, Chagnon MC, Siess MH, "et al", Canivenc-Lavier pharmacokinetics and metabolism of apigenin in female and male rats after a single oral administration, Drug Metab Dispos, 2005; 33(1): 49-54.
56. Strick R., Strissel P.L., Borgers S., Smith S.L., Rowley J.D., 2000, Dietary bioflavonoids induce cleavage in the MLL gene and may contribute to infant leukemia, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 97, 4790–4795.

Teratogenic effects of aqueous extract of aerial part of *Verbascum cheiranthifolium* in mouse embryo

Vatanchian M1*, Delavar A2, Shahsavand Sh3, Kamali H4

¹Department of Anatomy, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

² M.Sc of Histology & Embryology, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

³ Department of Physiology & Pharmacology, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

⁴ M.Sc of Chemical Engineering, Research Center of Natural Products Safety and Medicinal Plants, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

*Corresponding Author: Department of Anatomy, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran
Email: vatanchian@yahoo.com

Abstract

Background & Objectives: *Verbascum cheiranthifolium* is one of useful medicinal plant in Iranian traditional medicine that has many therapeutic effects including pain killer in stomachache, treatment of colds and bronchitis, antipyretic, migraine and antihemorrhoid. As mountaineer and people may use from extract of this plant, this study was undertaken to determine probable teratogenicity of aqueous extract of aerial part of *Verbascum cheiranthifolium* in mouse embryo.

Material & Methods: In this experimental study, 50 adult female mice after mating and observation of vaginal plug, divided into 5 groups (control, phenytoin, and 3 treatments by 2.25, 3 and 3.75 mg/kg dose of extract). All groups received aqueous extract of *Verbascum cheiranthifolium* at days 6, 8, 10, 12 and 14 of pregnancy intraperitoneally. Finally at the day of 18 of pregnancy, all embryos were removed by caesarian section and analyzed from aspect of viable, dead or reabsorption status. Furthermore, weight and CRL of fetuses were analyzed by caliper and digital balance. Using the technique of alizarin red – alcian blue double staining, macroscopic abnormalities of the skeleton were investigated. Data were analyzed using ANOVA and chi-square.

Results: Fetuses of treatment groups received aqueous extract of *Verbascum cheiranthifolium*, showed significant decrease in CRL and weight. Different skeletal anomalies appeared in fetuses including polydactyly, extra rib, conjoined ribs, scoliosis, spina bifida, palate cleft and imperfect skull ossification.

Conclusion: Based on clear teratogenic effects of aqueous extract of *Verbascum cheiranthifolium* in mouse embryo from aspect of growth retardation and inducing skeletal anomalies, it seems usage of this medicinal plant in pregnant women should be avoided.

Keyword: Teratogen, Skeletal anomaly, mouse embryo, *Verbascum cheiranthifolium*