

بررسی ارزش تشخیصی پرولکسیتوئین سرم در افتراق منزئت میکروبی از غیر میکروبی در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد

حمید آهنچیان^۱، فرج اشرف زاده^۲، عبدالکریم حامدی^۳، حمید فرهنگی^۴، سید علی جعفری^۵
، محمدعلی کیانی^۶، سید حمید حسینی^۷، علی خاکشور^{۸*}

^۱ دانشیار و فوق تخصص آلرژی ایمنولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۲ استاد و فوق تخصص اعصاب کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۳ استاد و فوق تخصص عفونی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۴ استادیار و فوق تخصص خون کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۵ دانشیار و فوق تخصص گوارش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۶ کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت،

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

^۷ استادیار و متخصص کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

^۸ نویسنده مسئول: مشهد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پست الکترونیک: khakshourA@mums.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: منزئت یکی از اورژانس های مهم در طب اطفال می باشد که نوع میکروبی آن میزان مرگ و میر و عوارض نسبتاً بالایی دارد، با توجه به اینکه حدود ۵٪ منزئت ها منشاً میکروبی دارند، یافتن راهی که با حساسیت بالا بتواند دو نوع منزئت را از یکدیگر تشخیص دهد دارای اهمیت می باشد. در این مطالعه سطح پرولکسیتوئین به عنوان معیاری برای تشخیص منزئت مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۳۲ کودک ۲ ماهه تا ۱۴ ساله مبتلا به منزئت مراجعه کننده به اورژانس اطفال انجام شد. نمونه ها بر اساس یافته های بالینی به دو گروه منزئت میکروبی و منزئت غیر میکروبی تقسیم شدند. برای همه بیماران آزمایشات لازم انجام شد. کودک سالم نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و پرولکسیتوئین و WBC خون در آنها اندازه گیری شد. سپس نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و آزمون های آماری من ویتنی، کای دو و تی تست در بین بیماران مقایسه گردید.

یافته ها: میانگین سنی کودکان ۴۲/۶ ماه بود. از بین متغیرهای مورد بررسی سن، جنسیت، CRP و ESR و CSF بین دو گروه منزئت میکروبی و غیر میکروبی تفاوت آماری معنی داری نداشت. هیچ یک از کودکان سالم پرولکسیتوئین بیشتر از ۱۰۰ ng/ml نداشتند. کودکان در گروه میکروبی و ۱۳/۸٪ در گروه غیر میکروبی دارای پرولکسیتوئین بیشتر از ۲۰ ng/ml بودند.

نتیجه گیری: پرولکسیتوئین می تواند به عنوان یک معیار کارآمد با نقطه برش ۲۰ ng/ml در افتراق افراد سالم از مبتلایان منزئت به کار رود. همچنین پرولکسیتوئین بیشتر از ۲۰ ng/ml را می توان به عنوان نقطه برش در تشخیصی منزئت میکروبی مشخص کرد.

واژه های کلیدی: منزئت میکروبی، منزئت غیر میکروبی، پرولکسیتوئین

و پانکراس منجر به تولید کلستیونین و دو مولکول دیگر می شود [۵-۷]. در مطالعات ذکر شده مقادیر پروکلیستونین در گردش خون عموماً خیلی پائین است و در افراد طبیعی کمتر از 0.01 ng/ml می باشد [۸]. در طی عفونت های ویروسی و بیماری های التهابی سطح سرمی پروکلیستونین به طور مختصر افزایش می یابد ولی به ندرت به مقادیر بالاتر از 1 ng/ml می رسد؛ اما در عفونت های شدید میکروبی سطح سرمی پروکلیستونین تا $20-200 \text{ ng/ml}$ افزایش می یابد. این تغییر عمدۀ در غلظت پروکلیستونین آن را به مارکری سودمند در امر تشخیص و احتمالاً در تعیین پیش آگهی عفونت های میکروبی تبدیل کرده است [۹]. برای اولین بار ژاندلر^۱ و همکارانش در سال ۱۹۹۳ ارزش پروگنوستیک پروکلیستونین در شدت و سیر پاسخ های التهابی به عفونت های میکروبی و قارچی را نشان دادند [۱۰]. پس از آن در مطالعات متعدد، همراهی نزدیک سطح سرمی پروکلیستونین با عفونت های میکروبی تهاجمی و کاهش آن پس از درمان آنتی بیوتیکی مناسب نشان داده شد [۱۱،۱۲]. در طی مطالعات انجام شده در مورد منزئتی های میکروبی سودمندی سنجش سطح سرمی پروکلیستونین نشان داده است که با حساسیت و ویژگی پیش از 90% قادر به افتراق منزئتی های میکروبی و ایصال می باشد [۱۳-۱۷]. هدف از این مطالعه تعیین ارزش تشخیصی سطح پروکلیستونین سرم در افتراق منزئتی میکروبی از غیر میکروبی در کودکان ۲ ماهه تا ۱۴ ساله مراجعه کننده به بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) طی سال ۹۱ می باشد.

روش کار

این مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۳۲ کودک مبتلا به منزئتی ۲ ماهه تا ۱۴ ساله مبتلا به منزئتی مراجعه کننده به اورژانس اطفال بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد در سال ۱۳۹۱ انجام شد. کودکان ۲ ماهه تا ۱۴ ساله که با تشخیص اولیه منزئتی (توسط متخصص اطفال) و سپس تشخیص قطعی منزئتی با انجام اسمیر و کشت CSF در بیمارستان های قائم (عج) و امام رضا (ع) ساخته

مقدمه

عفونت های سیستم عصبی مرکزی (CNS) شایع ترین علت تب همراه با علایم و نشانه های بیماری CNS در کودکان هستند که می تواند توسط انواع پاتوزن ها (باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و غیره) ایجاد شده باشد [۱]. بر همین اساس می توان منزئتی را به دو دسته منزئتی میکروبی و غیر میکروبی تقسیم کرد. به علت عوارض زیاد و مهم و همچنین نقشی که درمان در پیشگیری از عوارض دارد، در هر شیرخوار تب دار همراه با تغییرات سطح هوشیاری و سایر اختلالات عصبی باید منزئتی میکروبی در تشخیص های افتراقی قرار گرفته و اقدامات لازم جهت اثبات این تشخیص به عمل آید [۱،۲]. تشخیص منزئتی میکروبی مشکل است به خصوص در کودکان کوچکتر که علایم و نشانه ها اغلب غیر اختصاصی هستند [۱-۳]. اولین قدم در امر تشخیص آنالیز، اسمیر و کشت CSF می باشد. شمارش گلبول های سفید، میزان حساسیت CSF فاقد حساسیت و اختصاصی کافی پروتئین و قند CSF جهت رد یا تایید منزئتی میکروبی می باشند [۱-۴]. حساسیت رنگآمیزی گرم CSF بین $70-90\%$ گزارش شده است [۱] و کشت مثبت CSF در صورت عدم دریافت قبلی آنتی بیوتیک در $80-80\%$ موارد مثبت می شود [۲]. اما طبق آمار $25-50\%$ کودکانی که به علت منزئتی میکروبی LP (Lumbar Puncture) می شوند قبل از آنتی بیوتیک دریافت کرده اند [۱]. تمام موارد فوق بیانگر نیاز به روش های تكمیلی جهت تایید و یا رد منزئتی میکروبی است. با در نظر گرفتن این موضوع که حدود 5% منزئتی ها منشا میکروبی دارند [۱] و اهمیت جلوگیری از تجویز بی روبی آنتی بیوتیک، یافتن راهی که با حساسیت و اختصاصیت بالا بتواند دو نوع منزئتی (میکروبی و غیر میکروبی) را از یکدیگر تشخیص دهد و منجر به کاهش مصرف آنتی بیوتیک بشود منطقی است. اخیرا تحقیقاتی در مورد پروکلیستونین در تشخیص عفونت های شدید میکروبی و از جمله منزئتی میکروبی صورت گرفته است. پروکلیستونین یک گلیکوپروتئین ۱۱۶ اسید آمینه ای است که در شرایط نرمال توسط سلولهای C ساخته می شود و پس از شکسته شدن در بافت های ریه

یافته‌ها

از بین ۳۲ کودک مورد بررسی ۱۱ نفر (۳۶/۱ درصد) دختر و ۲۱ نفر (۶۳/۹ درصد) پسر بودند که از تعداد کل دختران ۷ نفر (٪۳۵) مبتلا به منژیت میکروبی و ۴ نفر (٪۳۳/۳) مبتلا به منژیت غیر میکروبی بودند در مورد پسران نیز ۱۳ نفر (٪۶۵) مبتلا به منژیت میکروبی و ۸ نفر (٪۶۶/۶) مبتلا به منژیت غیر میکروبی بودند. درنهایت ۲۰ نفر مبتلا به منژیت میکروبی و ۱۲ نفر مبتلا به منژیت غیر میکروبی مورد بررسی قرار گرفتند، که تفاوت معنی داری بین این دو گروه از لحاظ جنسیت مشاهده نشد ($P=0.121$).

میانگین سنی کودکان در این مطالعه $42/6 \pm 50/80$ ماه بود. میانگین سنی کودکان مبتلا منژیت میکروبی برابر $29/0/8 \pm 39/93$ ماه و منژیت غیر میکروبی برابر $58/0/8 \pm 58/57$ ماه بود که تفاوت معنی داری از لحاظ سن بین این دو گروه مشاهده نشد ($P=0.157$).

۲۱ نفر (٪۶۵/۶۲) از کودکان دچار منژیت دارای لوکوسیتوز بیش از 15000 بودند همچنین در افراد سالم (گروه شاهد) ۱ نفر (٪۵) از کودکان دچار منژیت دارای لوکوسیتوz بیش از 15000 و ۱۹ نفر (٪۹۵) دارای لوکوسیتوz کمتر از 15000 بودند که بر این اساس بین منژیت میکروبی و لوکوسیتوz بیش از 15000 ارتباط معناداری وجود داشت ($P<0.001$).

بین کودکان دچار منژیت میکروبی ۱۵ نفر (٪۷۵) دارای لوکوسیتوz بیش از 15000 و ۵ نفر (٪۲۵) دارای لوکوسیتوz کمتر از 15000 بودند. از کودکان دچار منژیت غیر میکروبی ۶ نفر دارای لوکوسیتوz بیش از 15000 و ۶ نفر (٪۵۰) دارای لوکوسیتوz کمتر از 15000 بودند. به طوری که لوکوسیتوz بیش از 15000 در منژیت میکروبی به طور معناداری بیشتر از منژیت غیر میکروبی بود ($P=0.016$).

CRP دو مثبت در ۵۰ درصد منژیت‌های میکروبی وجود داشت. ارتباط معنا داری بین میزان CRP با نوع منژیت دیده نشد ($P=0.885$) (جدول ۱). میانگین میزان ESR در منژیت میکروبی برابر با $55/5 \pm 38/94$ و در منژیت غیر میکروبی برابر $41/43 \pm 43/16$ بود که این تفاوت از

بسیاری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند و مواردی همچون بیماریهای جراحی اعصاب، نقص ایمنی، بیماریهای مزم ملیوی و قلبی، LP تروماتیزه (RBC) در مایع نخاع بیشتر از 10000 ، درمان قبلی منژیت، ارجاع از یک بیمارستان دیگر و عدم قطعیت نوع منژیت با ارزیابی‌های انجام شده به عنوان معیارهای خروج در این مطالعه محسوب شدند. انتخاب این معیارها در این مطالعه به این علت بود که علائم اولیه که شک به عفونت مغز را در کودکان زیاد می‌کند نامشخص بود. بر اساس معیارهای خروج ۴ کودک به علت درمان قبلی منژیت از مطالعه حذف شدند و ۳۲ کودک مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج آنالیز، اسمیر و کشت CSF بیماران به دو گروه منژیت میکروبی (۲۰ نفر) و غیرمیکروبی (۱۲ نفر) به عنوان گروه مورد انتخاب گردیدند و تعداد ۲۰ نفر کودک سالم (بدون تب و علایم منژیت) که برای معاينات روتین در بخش کودکان و اعصاب بیماران برای پیگیری و فالواپ به بیمارستان مراجعه میکردند به عنوان گروه شاهد جهت ارزیابی قدرت آزمایش در تشخیص افراد مبتلا به منژیت و افراد سالم انتخاب شدند. از تمام بیماران در ابتدای بسترهای یک نمونه خون وریدی از ورید براکیال WBC توسط پرستار دوره‌دیده گرفته و جهت بررسی ESR، CRP، بکار برده شد. آنالیز مایع CSF به همراه کشت آن نیز انجام گرفت. علایم بالینی بیماران شامل سردرد، تب، تشنجه و علایم تحریک منژ با استفاده از پرونده بیماران جمع‌آوری شد. آزمایش اندازه‌گیری پروکلسیتونین نیمه کمی، در آزمایشگاه ایمونولوژی-سرولوژی با استفاده از کیت‌های PCT-Q انجام شد. اساس تست بر روش ایمونوکروماتوگرافی برای تعیین پروکلسیتونین و با استفاده از آنتی-بادی‌های مونوکلونال روی کاست در زمان 30 دقیقه بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری و ورود به کامپیوتر، با استفاده از نرم‌افزار SPSS^{۱۷} مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل و مقایسه متغیرهای کمی و نرمال از آزمون تی تست و برای متغیرهای کمی و غیرنرمال و همچنین برای متغیرهای کیفی و رتبه‌ای از آزمون منویتنی استفاده گردید. جهت متغیرهای کیفی و اسمی نیز آزمون کایدو استفاده شد.

جدول ۱: میزان CRP در دو گروه منژیت

منژیت غیر میکروبی	منژیت میکروبی	CRP میزان
تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	
(٪۱۶/۶۶)۲	(٪۰/۲۰)۴	منفی
(٪۰/۲۵)۳	(٪۰/۱۵)۳	+۱
(٪۰/۴۱/۶۶)۵	(٪۰/۵۰)۱۰	+۲
(٪۰/۱۶/۶۶)۲	(٪۰/۱۰)۲	+۳
(٪۰/۰)۰	(٪۰/۵)۱	+۴
(٪۰/۱۰۰)۱۱	(٪۰/۱۰۰)۲۰	جمع

جدول ۲: مقادیر پروکلستیونین در بیماران مبتلا به منژیت و کودکان سالم

جمع	مقادیر پروکلستیونین			منژیت
	$2 < PCT < 1.0$	$.0/5 < PCT < 2$	$PCT < .0/5$	تعداد(درصد)
(٪۰/۱۰۰)۳۲	(٪۰/۱۵/۶۲)۵	(٪۰/۴۳/۷۵)۱۴	(٪۰/۴۰/۶۲)۱۳	
(٪۰/۱۰۰)۲۰	(٪۰/۰)۰	(٪۰/۰)۰	(٪۰/۱۰۰)۲۰	تعداد(درصد)
$P < .0/001$				سالم

جدول ۳: مقادیر پروکلستیونین در دو گروه منژیت

جمع	مقادیر پروکلستیونین			منژیت
	$2 < PCT < 1.0$	$.0/5 < PCT < 2$	$PCT < .0/5$	تعداد(درصد)
(٪۰/۱۰۰)۲۰	(٪۰/۸۰)۱۶	(٪۰/۵)۱	(٪۰/۱۵)۳	
(٪۰/۱۰۰)۱۱	(٪۰/۸/۳۳)۱	(٪۰/۸/۳۳)۱	(٪۰/۸۳/۳۳)۱۰	تعداد(درصد)
$P < .0/001$				منژیت غیر میکروبی

جدول ۴: علایم بالینی بیماران مبتلا به منزئت

P Value	منزئت میکروبی	منزئت غیر میکروبی			نتیجه	سردرد	علامت بالینی
		تعداد(درصد)	تعداد(درصد)	-			
۰/۲۳۵	(٪۴۱/۶۶)۵	(٪۷۰)۱۴	-	نتیجه	-	ردود	علامت بالینی
	(٪۵۸/۳۳)۷	(٪۳۰)۶	+				
۰/۱۶۵	(٪۰)۰	(٪۵)۱	-	نتیجه	-	تب	تشنج
	(٪۱۰۰)۱۲	(٪۹۵)۱۹	+				
۰/۳۷۰	(٪۶۶/۶۶)۸	(٪۶۵)۱۳	-	نتیجه	-	ردور	کرنیک
	(٪۳۳/۳۳)۴	(٪۳۵)۷	+				
۰/۷۳۵	(٪۷۵)۹	(٪۸۵)۱۷	-	نتیجه	-	بروزینسکی	بروزینسکی
	(٪۲۵)۳	(٪۱۵)۳	+				
۰/۱۶۵	(٪۱۰۰)۱۲	(٪۹۵)۱۹	-	نتیجه	-	-	-
	(٪۰)۰	(٪۵)۱	+				
۱	(٪۱۰۰)۱۲	(٪۱۰۰)۲۰	-	نتیجه	-	-	-
	(٪۰)۰	(٪۰)۰	+				

در سطح $0/5\text{ng/ml}$ ۱۰۰ درصد و حساسیت آن ۴۰/۶۲ درصد بود. همچنین تفاوت معناداری در مقدار پروکلسیتونین در دو گروه منزئت میکروبی و غیر میکروبی مشاهده گردید ($P<0/001$). حساسیت و ویژگی تست پروکلسیتونین در سطح 2 ng/ml ۱۰۰ درصد بود (جدول ۲ و ۳). شایع ترین علایم بالینی در منزئت میکروبی تب (٪۹۵)، تشنج (٪۳۵) و سردرد (٪۳۰)؛ و در منزئت غیر میکروبی تب (٪۱۰۰) و سردرد (٪۵۸/۳۳) بود. بر اساس آزمون کای اسکور بین دو گروه بیماران منزئت از نظر هیچ یک از علایم بیماری با هم تفاوت آماری معنا داری مشاهده نگردید (جدول ۴).

لحاظ آماری معنادار نمیباشد ($P=0/404$). در گروه منزئت میکروبی ۶ نفر (٪۳۰) دارای کشت مثبت مایع CSF و ۱۴ نفر (٪۷۰) دارای کشت منفی مایع بودند. در گروه منزئت غیر میکروبی نیز ۱۲ نفر (٪۱۰۰) از کودکان دارای کشت منفی مایع CSF بودند که مطابق این نتایج نتیجه مثبت کشت CSF با نوع منزئت ارتباط معناداری نداشت ($P=0/056$). مقادیر پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به منزئت و کودکان سالم مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد تفاوت آماری معنا داری بین مقادیر پروکلسیتونین در دو گروه از کودکان وجود دارد به طوری که هیچ یک از کودکان سالم پروکلسیتونین بیشتر از ۰/۵ نداشتند ($P<0/001$) ویژگی تست پروکلسیتونین

[۱۹]. مطالعه مروری و متانالیز یو^۳ و همکارانش در سال ۲۰۱۲ با هدف مقایسه پروکلسلیتوئین، CRP و لوکوسیتوز جهت تشخیص عفونتهای میکروبی در کودکان با تب بدون کانون انجام شد. در این مطالعه که از نتایج ۸ پژوهش برای آنالیز پروکلسلیتوئین، ۶ پژوهش برای CRP و ۷ پژوهش برای لوکوسیتوز استفاده شده است، نتیجه-گیری شد که پروکلسلیتوئین از تعداد لوکوسیت و CRP جهت تشخیص عفونتهای جدی میکروبی با تب بدون کانون بهتر می‌باشد [۲۰]. در مطالعه مروری تاکون^۴ که در سال ۲۰۱۲ با عنوان «تشخیص و ارزیابی منزئتیت میکروبی در کودکان» انجام شده نتایج آن نشان می‌دهد که پروکلسلیتوئین و CRP هر دو جهت افتراق منزئتیت واپرال و میکروبی بررسی شده‌اند و مقالات متعددی نشان دادند که پروکلسلیتوئین دقت تشخیصی بهتری در افتراق این دو دارد. با این حال اگرچه پروکلسلیتوئین در ترکیب با سایر سیستمتهای امتیاز دهنده بالینی (سایر عالیم بالینی و آزمایشگاهی) حساسیت تشخیصی را بالا می‌برند ولی در حال حاضر به عنوان فاکتوری که تشخیص را قطعی کند، در نظر گرفته نمی‌شود. در مطالعه ما نیز پروکلسلیتوئین در دو گروه تفاوت معنادار داشته ولی CRP چنین نبوده است [۲۱]. همچنین مطالعه سایمون^۵ و همکارانش [۲۲] نشان می‌دهد دقت تشخیصی پروکلسلیتوئین از مارکر CRP جهت تشخیص عفونتهای میکروبی مشکوک که بستری شده‌اند بالاتر می‌باشد. در یک مطالعه مقطعی در بیمارستان شهدای تجریش [۲۳] ۷۶ نوزاد مشکوک به سپسیس وارد مطالعه شدند. مجموع یافته‌های این مطالعه نشان داده است که می‌توان از پروکلسلیتوئین برای تشخیص سپسیس برای تعداد قابل توجهی از نوزادان مبتلا استفاده نمود؛ اما ویژگی آن پایین بوده و امکان تشخیص افراد سالم با محدودیت همراه است. محققین این مطالعه از ارزش پروکلسلیتوئین به عنوان جزیی از بررسی تشخیص سپسیس حمایت نموده و انجام مطالعات بیشتر در این زمینه را برای رسیدن به نتیجه قطعی‌تر لازم می‌دانند. تفاوت نتایج این مطالعه با مطالعه

بحث

این مطالعه نشان داد که میزان پروکلسلیتوئین در کودکان مبتلا به منزئت با کودکان سالم تفاوت معناداری داشته است، ویژگی تست پروکلسلیتوئین در سطح کمتر از ۲ng/ml ۱۰۰٪ و حساسیت آن ۸۴/۳۷٪ بود. می‌توان میزان پروکلسلیتوئین ۲ng/ml را به عنوان نقطه برش تعريف نمود. با توجه به اینکه سطح پروکلسلیتوئین در کودکان دچار منزئت میکروبی با کودکان مبتلا به منزئت غیر میکروبی تفاوت معنادار دارد، ویژگی تست پروکلسلیتوئین در کودکان مبتلا به منزئت در افتراق کودکان مبتلا به منزئت باکتریال از غیر میکروبی در سطح بیشتر از ۲ng/ml ۱۰۰٪ و حساسیت ۱۰۰٪ بود. می‌توان ۲ng/ml را به عنوان نقطه برش در افتراق کودکان مبتلا به منزئت باکتریال از غیر میکروبی مشخص نمود. همچنین میزان CRP و ESR بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت ولی درصد PMN، قند و پروتئین مایع CSF و لوکوسیتوز بیشتر از ۱۵۰۰۰ بین دو گروه تفاوت معنادار داشته است. مطالعه سئو^۶ و همکارانش در کره جنوبی بر روی ۶۳ کودک مبتلا به منزئت نشان داد که از بین پروکلسلیتوئین سرم، CRP، تعداد WBC و نوتوفیل CSF، مقدار گلوکوز CSF و میزان پروتئین در CSF که همگی به طور معناداری در گروه میکروبی بالاتر بودند، افتراق دهنده ترین پارامتر جهت تشخیص منزئت میکروبی پروکلسلیتوئین سرم بوده است و میزان پروکلسلیتوئین بیشتر از ۱ng/ml ۹۰٪ حساسیت و اختصاصیت ۸۰٪ داشته است. [۱۸] همچنین مطالعه الخلولی^۷ در مصر که روی ۴۰ کودک مبتلا به منزئت انجام شده است، نشان داد که سطح پروکلسلیتوئین به طور معناداری در بیماران منزئت میکروبی بالاتر از بیماران با منزئت واپرال بوده است و تمام پارامترهای CSF، تعداد لوکوسیت‌های خون محیطی و CRP بین دو گروه منزئت همپوشانی داشته است. در این مطالعه پروکلسلیتوئین بیشتر از ۲ng/ml ۷۶٪ جهت تشخیص منزئت میکروبی دارای حساسیت ۱۰۰٪ و اختصاصیت ۶۶٪ عنوان شده است

ما ممکن است در تفاوت سنی کودکان مورد مطالعه و نیز نوع متفاوت بیماری باشد.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد در تمام مطالعات بر ارزش پروکلیستونین سرم در تشخیص منزئت میکروبی تاکید شده است ولی در مورد نقطه برش توافق وجود ندارد که می‌تواند به علت تفاوت در کیت‌های آزمایشگاهی مورد استفاده باشد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بین سطح پروکلیستونین در کودکان مبتلا به منزئت در مقایسه با کودکان سالم تفاوت معناداری وجود دارد با توجه به ویژگی ۱۰۰ درصدی و حساسیت ۸۴/۳٪ درصدی تست پروکلیستونین در سطح ۲ng/ml می‌توان آن را به عنوان نقطه برش قلمداد کرد. هم چنین حساسیت و ویژگی تست پروکلیستونین در سطح ۲ng/ml ۲جهت تشخیص منزئت باکتریال از غیر میکروبی ۱۰۰ درصد بود بنابراین می‌توان ۲ng/ml را به عنوان نقطه برش تشخیصی منزئت میکروبی از منزئت غیر میکروبی در اطفال تعریف کرد. لذا پیشنهاد می‌گردد توسط محققان طرح‌های مشابه با حجم نمونه بیشتر در زمینه بررسی سطح پروکلیستونین در عفونت‌های ویروسی و میکروبی CNS انجام گیرد و همچنین به اندازه گیری سطح پروکلیستونین پس از شروع درمان آنتی بیوتیکی جهت بررسی قابلیت آن در پیشگویی پاسخ به درمان پرداخته شود.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل انجام طرحی تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خراسان شمالی با کد ۸۹/پ/۲۱۳ است که با حمایت مالی آن معاونت‌ها انجام شده است. پژوهشگران وظیفه خود می‌دانند از همکاری و مساعدت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و خراسان شمالی و نیز تمام عزیزانی که در انجام این پژوهش همکاری داشته‌اند، تشکر کنند.

References

- Charles G , Prober,Central nervous system infection In Behrman, Keligman, Jenson edi. Nelson Textbook of Pediatrics 17th edition 2004; 2038 -2047
- Saez - Llorens X, McCracken GH Jr, Bacterial meningitis in children, Lancet, 2003 Jun 21; 361(9375):2139 -48.
- El Bashir H, Laundy M, Booy R, Diagnosis and treatment of bacterial meningitis.
- Tunkel AR, Scheld WM, Acute bacterial meningitis, Lancet, 1995 Dec 23-30; 346 (8991-8992): 1675-80.
- Kotilainen P, Jalava J, meurman O, Lehtonen OP, Rintala E, Seppala OP, Eerola E, Nikkari S, Diagnosis of meningococcal meningitis by broad – range bacterial PCR with cerebrospinal fluid, J Clin Microbiol, 1998 Aug; 36 (8): 2205-9.
- Saravolatz LD, Manzor O, Vander Velde N, Pawlak J, Belian B, Broad – range bacterial polymerase chain reaction for early detection of bacterial meningitis, Clin Infect Dis. 2003 Jan 1; 36 (1): 40-5. epub 2002 Dec 12.
- Carrol ED, Thomson AP, Hart CA. Procalcitonin as a marker of sepsis, Int J Antimicrob Agents, 2002 Jul; 20(1): 1-9.
- Gendrel D, Bohuon C, Procalcitonin as a marker of bacterial infection, Pediatr Infect Dis J. 2000 Aug; 19(8): 679-87.
- Nijsten MW, Olinga P, The TH, "et al",Procalcitonin behaves as a fast responding acute phase protein in vivo and in vitro, Crit Care Med 2000; 28:458-61.
- Gendrel D, Assicot M, Carsin H, Raymond J, Guilbaud J, Bohuon C, High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and in patients with sepsis and infection, Lancet, 1993Feb 27;341 (8844):515-8.
- Oberhoffer M, Vogelsang H, Jager L, Reinhart K. Katacalcin and calcitonin immunoreactivity in different types of leukocytes indicate intracellular procalcitonin content, J Crit Care 1999; 14:29-33.
- Oberhoffer M, Stonans I, Russwurm S, " et al",Procalcitonin expression in human peripheral blood mononuclear cells and its modulation by lipopolysaccharides and sepsis- related cytokines in vitro, J Lab Clin Med 1999; 134:49-55.
- Mary R, Veinberg F, Couderc R, [Acute meningitides, acute phase proteins and procalcitonin]. Ann Biol Clin (Paris), 2003 Mar – Apr; 61(2): 127-37.
- Nathan Br, Scheld WM, The potential roles of C- reactive protein and procalcitonin concentrations in the serum and cerebrospinal fluid in the diagnosis of bacterial meningitis, Curr Clin Top Infect Dis. 2002; 22:155-65.
- Marc E, Menager C, Moulin F, Stos B, Chalumeau M, Guerin S, Lebon P, Brunet F, Raymond J, Gendrel D, [Procalcitonin and viral meningitis: reduction of unnecessary antibiotics by measurement during an ot break] Arch Pediatr, 2002 Apr; 9(4): 358-64.
- Shimetani N, Shimetani K, Mori M, Levels of three inflammation markers, Creactive protein, serum amyloid A protein and procalcitonin, in the serum and cerebrospinal fluid of patients with meningitis, Scand J clin lab invest, 2001; 61(7): 567-74.
- Jereb M, Muzlovic I, Hojker S, Strle F, Predictive value of serum and cerebrospinal fluid rocalcitonin levels for the diagnosis of bacterial meningitis. Infection, 2001 Aug; 29 (4): 209-12.
- O M, Seo D, Kwak M, Shin J, Serum Procalcitonin and C-reactive Protein Level as a Early Diagnostic Marker of Bacterial Meningitis in the Emergency Department, Annals of Emergency Medicine 2012 Oct; 60(4):22
- Alkhali UM, Abd Al-Monem N, Abd El-Azim AA, Sultan MH, Serum Procalcitonin in Viral and Bacterial Meningitis, J Glob Infect Dis. 2011 Jan;3(1):14-8
- Yo CH, Hsieh PS, Lee SH, Wu JY, Chang SS, Tasi KC, Lee CC, Comparison of the Test Characteristics of Procalcitonin to C-Reactive Protein and Leukocytosis for the Detection of Serious Bacterial Infections in Children Presenting With Fever Without Source: A Systematic Review and Meta-analysis, Ann Emerg Med. 2012 Nov;60(5):591-600
- Tacon CL, Flower O. 2, Diagnosis and management of bacterial meningitis in the paediatric population: a review, Emerg Med Int. 2012 Sep

22.Simon L, Gauvin F, Amre DK, Saint-Louis P, Lacroix J, Serum procalcitonin and C-reactive protein levels as markers of bacterial infection: a systematic review and meta-analysis, Clin Infect Dis. 2004 Jul 15;39(2):206-17

23.Fallahi M, Ghodsy M, Halimi Asl AA, Basir MF, Determination of Procalcitonin Test Sensitivity and Specificity in Diagnosis of Neonatal Sepsis, Shohadaye Tajrish Hospital, 2007; Pajoohandeh Journal, 2009; 14 (2):83-87[Persian].

Evaluate the diagnostic value of procalcitonin to differentiate viral from bacterial meningitis in children admitted to the pediatric emergency

Ahanchian H¹,Ashrafzadeh F²,Hamedi AB³,Farhangi H⁴,Jafari SA⁵.Kiani MA⁵,
Hosseini SH⁶,khakshour A^{7*}

¹Associate professor of Pediatrics Allergist-immunologist, Mashhad University of Medical Science, Mashhad,Iran.

²professor of Pediatrics Neurology, Mashhad University of Medical Science, Mashhad,Iran..

³professor of Pediatrics Infectious Diseases, Mashhad University of Medical Science , Mashhad ,Iran.

⁴Assistant professor of Pediatrics oncology, Mashhad University of Medical Science , Mashhad ,Iran.

⁵Associate professor of Pediatrics Gastroenterolog, Mashhad University of Medical Science , Mashhad, Iran

⁶MSc of Health Science, Vector-borne Diseases Research Center, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Bojnurd, Iran.

⁷Assistant Professor of Pediatric , Mashhad University of Medical Science, Mashhad,Iran

*Corresponding Author: Mashhad University of Medical Science.

Email:KhakshourA@mums.ac.ir

Abstract

Background & Objectives: Meningitis is one of the important emergencies in pediatrics. Proper and timely treatment prevents high mortality and morbidity of bacterial meningitis. Given that only 5% of meningitis are bacterial, finding a sensitive method to discriminate between the two types of meningitis is of clinical importance. In this study procalcitonin levels as a criterion for the diagnosis of bacterial meningitis and aseptic was studied.

Material & Methods: This was a case control cross sectional study in which 32 children with clinically suspected meningitis admitted to the hospital were studied. According to the clinical findings and results of CSF analysis, the patients were classified into two groups: bacterial meningitis and aseptic meningitis. For all cases CSF analysis & culture were done and procalcitonin,ESR, CRP & WBC were measured. Twenty healthy children were selected as control group and their procalcitonin and WBC was measured. Data were analyzed by SPSS software.

Results: The average age was 42.6 months. There was no significant difference between two groups in terms of age, sex, ESR, CRP and CSF culture. Serum procalcitonin levels in control group were less than 0.5ng/ml. 80% of bacterial meningitis and only one child (8.33%) in aseptic meningitis had serum procalcitonin more than 2ng/ml.

Conclusion:Serum procalcitonin level could be used as a useful diagnostic test with the cut off point 0.5ng/ml differentiating healthy subjects from patients with meningitis. and Procalcitonin more than 2 ng / ml can be identified as Cut of Point diagnosis of bacterial meningitis.

Key words:Bacterial meningitis,Aseptic meningitis,Procalcitonin.

Recived:3 Mar 2015

Revised:27 Jun 2015

Accepted:16 Aug 2015