

میزان آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری در مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد - سال ۱۳۹۴

سید حمید حسینی^۱، رضوان رجب زاده^۲، مریم آخوندان^۳، حمید رضا محدث حکاک^۴،
حمید توکلی قوچانی^۴، ملیکا نیازی^{۵*}

^۱ کارشناس ارشد آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۲ دانشجوی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
^۳ مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
^۴ استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
^۵ دکترای حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
پست الکترونیک: negin124289@yahoo.com

چکیده

زمینه و هدف: روزه داری برای بیماران دیابتی یک تصمیم بسیار مهم است. برای روزه داری بدون خطر و کاهش عوارض بیماران دیابتی که تمایل به روزه داری در ماه رمضان دارند، داشتن آگاهی ضروری می باشد لذا هدف از این مطالعه تعیین آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری می باشد.

مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی که بر روی ۳۷۶ بیمار دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۴ انجام شد واحدهای پژوهش به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها با استفاده پرسشنامه ای دو بخشی جمع آوری گردید و پس از ورود به کامپیوتر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 16 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده $54/35 \pm 15/83$ و $48/3$ ٪ افراد بیسواد بودند. $62/3$ ٪ افراد زن و $90/3$ ٪ مبتلا به دیابت نوع دو بودند. میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه $35/31 \pm 11/36$ بود. میانگین بیشترین پاسخ صحیح در حیطه تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان $51/03 \pm 18/49$ و کمترین پاسخ صحیح در حیطه مصرف داروهای پایین آورنده قند خون در ماه رمضان $18/0 \pm 23/44$ بود بین میانگین نمره افراد برحسب سطح تحصیلات فقط در نمره کل کسب شده اختلاف معنی دار آماری وجود داشت ($p=0/035$).

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از پایین بودن آگاهی بیماران دیابتی در زمینه دیابت و روزه داری است لذا افزایش آگاهی بیماران دیابتی می تواند نقش مهمی در کنترل بیماری، پیشگیری از عوارض آن و وضعیت سلامتی فرد داشته باشد.

واژه های کلیدی: آگاهی، دیابت، روزه داری

وصول: ۹۵/۶/۸

اصلاح: ۹۵/۸/۱۰

پذیرش: ۹۵/۹/۲۱

مقدمه

روزه از جمله اعمال عبادی است که خداوند به آن امر فرموده است و در آن انسان در طول مدت معین و ساعات خاصی از شبانه روز، از خوردن و آشامیدن و غیره باید خودداری نماید. روزه داری ماه رمضان یک فریضه واجب برای تمام مسلمانان بالغ است. با این حال، در شرایطی که روزه داری برای بدن مضر باشد، فرد از آن منع می شود بنابراین پزشک و بیمار باید بر اساس شواهد علمی موجود، شدت بیماری و اثرات روزه داری بر آن در خصوص روزه داری تصمیم گیری نمایند [۱]. روزه داری اسلامی به لحاظ آنکه با سایر انواع بی غذایی متفاوت است به طور حتم تأثیرات متفاوتی بر سلامت انسان و نیز بیماری ها دارد تغییرات در گلوکز، چربی و سایر شاخص های بیوشیمیایی خون در زمان روزه داری به عوامل مختلفی از جمله عادات غذایی، میزان کالری، نوع غذای مصرفی، درجه حرارت محیط، فصل بررسی و غیره بستگی دارد [۲]. دیابت یکی از بیماری هایی است که روزه و رژیم غذایی بر آن تأثیر دارد. دیابت شایع ترین بیماری متابولیک دنیا است و سالانه ۴ میلیون مرگ به خاطر این بیماری در دنیا رخ می دهد که ۹ درصد مرگ ها را شامل می شود [۳]. در طول قرن گذشته پیوسته بر شیوع دیابت خصوصاً نوع ۲ در جهان افزوده شده است و اگر اقدامی صحیح برای مقابله با این بیماری صورت نگیرد تخمین زده می شود که تا سال ۲۰۳۰ تعداد مبتلایان ۲ برابر شده و نزدیک به ۳۵۰ میلیون فرد به دیابت مبتلا خواهد شد [۴]. دیابت باعث ایجاد عوارض خطرناکی همانند آترواسکروزیس، رتینوپاتی، نوروپاتی منجر شونده به نارسایی کلیه، نوروپاتی محیطی با خطر عوارض پای دیابتی می گردد [۵]. مرگ تطبیق یافته سنی به خاطر بیماری های قلبی عروقی در اغلب بیماران ۲ تا ۴ برابر بیشتر از افراد غیر دیابتی می باشد [۶]. قطع عضو در افراد دیابتی حداقل ۱۰ برابر شایع تر از افراد غیر دیابتی می باشد [۵] و بیش از نصف قطع عضوهای غیر ترومایی به دلیل دیابت رخ می دهد. در کشورهای توسعه یافته دیابت یکی از علت های اصلی اختلال بینایی و کوری می باشد [۷-۹]. با توجه به اینکه بیماری دیابت از جمله اختلالاتی

است که به مقدار زیاد تحت تأثیر تغییرات شیوه زندگی قرار می گیرد و پیروی از یک رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی و مصرف منظم داروهای تجویز شده از اولویتهای یک برنامه مطلوب کنترل دیابت محسوب می شود [۱]. لذا روزه داری برای بیماران دیابتی یک تصمیم شخصی و بسیار مهم است که باید با توجه به دستورالعمل های دینی و مشاوره های پزشکی در خصوص وضعیت سلامتی فرد انجام شود [۱۰]. بسیاری از بیماران دیابتی نوع ۱ و ۲ بدون در نظر گرفتن وضعیت بیماری خود اصرار به روزه داری دارند. مطالعه جمعیتی اپیدمیولوژی دیابت و رمضان (EPIDIAR)^۱ بیانگر این است که تقریباً ۴۳٪ بیماران دیابتی نوع یک و ۷۹٪ بیماران دیابتی نوع دو طی ماه رمضان روزه می گیرند. این بدان معناست که تقریباً بیش از ۵۰ میلیون بیمار دیابتی در جهان طی ماه رمضان روزه می گیرند [۱۱، ۱۲]. در مطالعه EPIDIAR خطر هیپوگلیسمی حاد (منجر به بستری)، در مبتلایان دیابت نوع یک، ۴/۷ برابر و در میان مبتلایان دیابت نوع دوم، ۷/۵ برابر سایر افراد روزه دار گزارش شده است. در این مطالعه افزایش ۵/۵، برابری خطر ایجاد هایپرگلیسمی حاد (منجر به بستری) متعاقب روزه داری در میان مبتلایان دیابت نوع یک نشان داده شده است [۱۲]. در بیماران دیابتی، کنترل استرس و نیز ثابت بودن چرخه خواب و بیداری بر کنترل قند خون مؤثرند. از سوی دیگر، در روزه داری ماه رمضان اغلب تغییرات قابل ملاحظه ای در اجزای شیوه زندگی بوجود می آید. لذا این احتمال وجود دارد که تغییرات ایجاد شده از یک سو و عدم آگاهی از چگونگی مقابله با آنها از سوی دیگر سبب اختلال در کنترل این بیماری در ایام ماه رمضان و تشدید عوارض حاد مانند هیپو و هایپرگلیسمی شود [۱]. مطالعات مختلف بر نقش اساسی خود مراقبتی در کنترل دیابت تأکید کرده اند. بیمارانی که توانایی خود مدیریتی بیماری دیابت را ندارند، نمی توانند در شرایط مختلف من جمله حملات هایپوگلیسمی و هایپرگلیسمی پاسخ مناسبی داشته باشند [۱۳]. این امر نشان دهنده اهمیت امر آموزش های بیشتر پیش از آغاز ماه

آگاهی ضعیف، امتیاز (۳۴-۶۶) آگاهی متوسط و امتیاز بین (۶۷-۱۰۰) به عنوان آگاهی مطلوب تقسیم بندی گردید [۱۶].

با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیتی نیز اطلاعاتی شامل جنس، سن، میزان تحصیلات، ابتلا به دیابت نوع یک یا دو، مدت زمان ابتلا به دیابت و نوع داروی مصرفی جمع آوری شد. اطلاعات مربوط به داده‌های آزمایشگاهی بیماران با استفاده از آخرین نتایج آزمایش خون ثبت شده در پرونده‌های بیماران به دست آمد. وزن بیماران نیز با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۱۰۰ گرم اندازه‌گیری و ثبت شد. کلیه داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری نسخه ۱۶ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت سنجش ارتباط بین متغیرهای کمی مانند سن، وزن، مدت زمان ابتلاء به دیابت، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله از ضریب همبستگی پیرسون و جهت مقایسه بین گروهها از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرف استفاده شد.

یافته‌ها

در این مطالعه که بر روی ۳۷۶ نفر از بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد انجام گرفت میانگین سنی افراد شرکت کننده $54/35 \pm 15/83$ بود. اکثر شرکت کنندگان در مطالعه زن (۶۲٪) بودند. همچنین ۹۰٪ افراد مبتلا به دیابت نوع دو بودند و ۳٪ افراد بیسواد بودند (جدول ۱). میانگین نمره آگاهی افراد شرکت کننده در مطالعه $35/31 \pm 11/36$ بود به طور میانگین بیشترین پاسخ صحیح در حیطه تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان $51/03 \pm 18/49$ و کمترین پاسخ صحیح در حیطه مصرف داروهای پایین آورنده قند خون در ماه رمضان $18/0 \pm 23/44$ بود (جدول ۲). آگاهی ۴۲٪ افراد ضعیف، ۵۶٪ متوسط و ۳٪ مطلوب بود. بین میانگین نمره افراد برحسب سطح تحصیلات فقط در نمره کل کسب شده اختلاف معنی دار آماری وجود داشت ($p=0/035$). به طوری که با افزایش سطح تحصیلات میزان آگاهی افزایش یافته است (جدول ۳). بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای سن، وزن، میزان قند خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و میزان آگاهی ارتباط معنی دار آماری وجود نداشت. بر اساس

رمضان توسط پزشکان معالج و مراقبان سلامتی می‌باشد [۱۴]. مطالعه در دیگر کشورها نشان داده است که اگر بیماران دیابتی نوع دو با شرایط پایدار، به شکل مناسبی تحت آموزش و مراقبت قرار گیرند، می‌توانند روزه بگیرند [۱۵]. در مطالعه‌ای که توسط خوش نیت انجام شد نتایج نشان داد میزان آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه‌داری پایین می‌باشد [۱۶]. بنابراین برای آموزش کارا و موثر، روزه‌داری بدون خطر و کاهش عوارض و مشکلات احتمالی بیماران دیابتی که تمایل به روزه‌داری در ماه رمضان دارند، ارزیابی آگاهی این بیماران در این حیطه، بسیار مهم است [۱۷]. لذا هدف این مطالعه بررسی آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری می‌باشد.

روش کار

مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) است که بر روی بیماران دیابتی نوع یک و دو مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد در سال ۱۳۹۴ انجام شد. حجم نمونه با استفاده از انحراف معیار ۴ درصد و حداکثر خطای ۰/۴ تعداد ۳۷۶ تعیین گردید. جهت انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری آسان استفاده شد، به این صورت که کلیه افرادی که دارای پرونده مراقبت بیماران دیابتی در کلینیک دیابت بودند پس از دادن اطلاعات لازم توسط مصاحبه کنندگان در زمینه اهداف طرح و کسب رضایت آگاهانه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای تحت عنوان بررسی آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه‌داری استفاده شد که توسط خوش نیت و همکاران تنظیم گردیده بود و روایی و پایایی این پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ ۰/۷۹ بود. این پرسشنامه از دو پرسشنامه اطلاعات تخصصی و اطلاعات جمعیتی تشکیل شده بود. پرسشنامه اطلاعات تخصصی شامل ۲۹ پرسش (۳ سوال در زمینه روزه داری بیماران دیابتی، ۳ سوال در زمینه چگونگی مصرف داروهای کنترل کننده قندخون در ماه رمضان، ۵ سوال در زمینه چگونگی کنترل قندخون، ۲ سوال در زمینه فعالیت بدنی و ۱۶ سوال در زمینه تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان) بود. هر پاسخ درست معادل یک امتیاز در نظر گرفته شد و امتیاز نهایی هر فرد به صورت درصد بیان شد. امتیاز بین (۰-۳۳) به عنوان

جدول ۱: مشخصات پایه بیماران دیابتی مورد بررسی

متغیر	میانگین \pm انحراف معیار	فراوانی (درصد)
سن (سال)	$54/35 \pm 15/83$	-
وزن (کیلوگرم)	$65/27 \pm 15/20$	-
جنس		
زن	-	۲۳۴ (۶۲/۳)
مرد	-	۱۴۲ (۳۷/۷)
نوع دیابت		
دیابت نوع یک	-	۳۶ (۹/۷)
نوع دو	-	۳۴۰ (۹۰/۳)
مدت زمان ابتلا به دیابت (ماه)	$6/1 \pm 4/5$	-
قند خون ناشتا (میلی گرم در دسی لیتر)	$175/88 \pm 80/2$	-
هموگلوبین گلیکوزیله	$10/22 \pm 2/52$	-
سطح تحصیلات		
بی سواد	-	۱۸۲ (۴۸/۳)
ابتدایی	-	۱۲ (۳/۳)
راهنمایی	-	۰ (۰/۰)
دبیرستان	-	۱۷۲ (۴۵/۷)
دانشگاه	-	۱۰ (۲/۷)
داروی مصرفی		
داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون	-	۳۳۲ (۸۸/۳)
انسولین	-	۳۵ (۹/۳)
داروهای خوراکی + انسولین	-	۹ (۲/۳)

جدول ۲: میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد روزه داری

انحراف معیار \pm میانگین	صدک ۲۵	صدک ۵۰	صدک ۷۵	
$37/15 \pm 27/44$	۳۳/۳۳	۳۳/۳۳	۶۶/۶۷	شرایط روزه داری بیماران دیابتی
$18/0 \pm 23/44$	۰/۰۰	۰/۰۰	۳۳/۳۳	مصرف داروهای پایین آورنده قند خون در ماه رمضان
$36/42 \pm 20/58$	۲۰/۰۰	۴۰/۰۰	۶۰/۰۰	چگونگی کنترل قند خون در ماه رمضان
$33/78 \pm 29/98$	۰/۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	فعالیت بدنی در ماه رمضان
$51/03 \pm 18/49$	۴۳/۷۵	۵۶/۲۵	۶۲/۵۰	تغذیه بیماران دیابتی در ماه رمضان
$35/31 \pm 11/36$	۲۷/۵۰	۳۵/۹۲	۴۲/۵۸	امتیاز کل

جدول ۳: رابطه بین تحصیلات و میزان آگاهی بیماران دیابتی در مورد روزه داری

انحراف معیار \pm میانگین		
تحصیلات	بی سواد	۳۳/۸۷ \pm ۱۱/۶۵
	ابتدایی	۳۳/۳۶ \pm ۹/۰۳
	دبیرستان	۳۶/۴۶ \pm ۱۱/۳۲
	دانشگاهی	۴۴/۲۰ \pm ۱۲/۸۹
	کل	۳۵/۳۴ \pm ۱۱/۵۷
		p=۰/۰۳۵ F=۲/۹۱

آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نیز بین میانگین آگاهی افراد برحسب نوع داروی مصرفی اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت. آزمون تی مستقل هم نشان داد بین میانگین نمره آگاهی افراد بر حسب جنس و نوع دیابت اختلاف معنی دار آماری وجود نداشت ($p > 0/05$)

بحث

در این مطالعه، شرکت کنندگان به طور میانگین به ۳۵/۳۱٪ سوالات پرسشنامه پاسخ صحیح دادند. به طوری که ۴۲/۲٪ افراد دارای آگاهی ضعیف و ۵۶/۹٪ آگاهی متوسط داشتند این نتایج حاکی از سطح پایین آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری است. در مطالعه خوش نیت و همکاران نیز که بر روی ۲۰۰ بیمار دیابتی انجام شد شرکت کنندگان به طور میانگین به ۴۶٪ سوالات پرسشنامه پاسخ صحیح دادند و از آگاهی پایینی نسبت به دیابت و روزه داری برخوردار بودند [۱۶]. نتایج مطالعه گبوریت^۱ و همکاران بر روی ۱۰۱ بیمار دیابتی مسلمان نشان داد که میزان آگاهی بیماران دیابتی در زمینه روزه داری پایین است که مشابه با نتایج این مطالعه است [۱۸]. اگرچه در مطالعه فاطیما^۲ و همکاران نیز که بر روی ۶۹ بیمار دیابتی انجام شد امتیاز آگاهی بیماران دیابتی $6/81 \pm 1/63$ از مجموع ۱۰ امتیاز بوده است [۱۹]. در مطالعه دیگری که بر روی بیماران دیابتی در پاکستان انجام شد، سطح آگاهی در بیماران دیابتی ضعیف و برابر

۵۴٪ بود [۲۰]. بررسی آگاهی بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستانی در پاکستان نیز نشان داد که در زمینه علائم، روشهای درمانی و عوارض دیابت به ترتیب ۱۲٪، ۳۵٪ و ۵۳٪ بیماران آگاهی ضعیفی داشتند [۲۱]. در مطالعه‌ای که در رشت انجام شد اکثریت بیماران دیابتی نوع یک شرکت کننده در این مطالعه آگاهی پایینی در زمینه دیابت و روزه داری داشتند [۲۲]. در مطالعه انجام شده در زیمباوه اکثریت شرکت کنندگان امتیاز متوسطی در هر سه قسمت پرسشنامه آگاهی سنجی بیماران دیابتی (آگاهی عمومی دیابت، استفاده از انسولین و آگاهی کل) کسب کردند که کمترین امتیاز را عمدتاً در زمینه رژیم غذایی، استفاده از انسولین و کنترل قندخون به دست آوردند [۲۳]. اکثر شرکت کنندگان در این مطالعه بیسواد بودند و اختلاف آماری معنی داری بین تحصیلات با آگاهی افراد در زمینه دیابت و روزه داری وجود داشت به طوری که با تحصیلات بالا میزان آگاهی افراد نیز افزایش یافته است. این یافته با مطالعه خوش نیت و همکاران همخوانی دارد [۱۶]. در مطالعه فاطیما، ۴۲٪ شرکت کنندگان بیسواد یا تحصیلات ابتدای داشتند. در این مطالعه افزایش آگاهی همبستگی منفی با میزان تحصیلات نشان داده است. امتیاز آگاهی تا گروه تحصیلات متوسطه روند افزایشی نشان داده و سپس با افزایش سطح تحصیلات با کاهش روبرو شده است [۱۹]. در مطالعه‌ای که در رشت انجام شد، بیش از ۸۰٪ بیماران تحصیلات کمتر از دیپلم داشتند و میان میزان آگاهی و

1-Gaborit

2-Fatima

تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله قدردانی خود را از کلیه پرسنل زحمت کش و بیماران دیابتی کلینیک دیابت شهرستان بجنورد اعلام می دارند.

سطح تحصیلات بیماران ارتباط معناداری مشاهده نشد [۲۲]. در مطالعه زیمباوه بین میزان تحصیلات و سطح آگاهی بیماران دیابتی نیز ارتباط مستقیم آماری وجود داشت و میانگین امتیازات به دست آمده در مطالعه هو^۱ و همکاران نیز نشان دهنده وجود کمبودهای اساسی در آگاهی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو چینی به ویژه در زمینه علل و فیزیولوژی دیابت و رژیم غذایی دیابتی بود. ارتباط میزان آگاهی با سطح بالاتر تحصیلات در این مطالعه تایید شد [۲۳]. در مطالعات بروس، هه، مک فرسون^۲ نیز ارتباط آماری مثبتی بین میزان تحصیلات و سطح آگاهی بیماران دیابتی وجود داشت که با نتایج این مطالعه همخوانی دارد [۲۴-۲۶]. از آنجا که آگاهی می تواند سبب عملکرد بهتر و مناسبتر فرد شود، لذا آگاهی بیماران دیابتی نیز می تواند نقش مهمی در کنترل بیماری، پیشگیری از عوارض آن و وضعیت سلامتی فرد داشته باشد [۲۷]. آگاهی ناکافی بیماران در زمینه بیماری، عوارض و روشهای کنترل و درمان آن ممکن است مانع از اجرای راهبردهای ارتقاء سلامت شود. لذا آگاهی بیماران در مورد تغییراتی که به دلیل روزه داری در شیوه زندگی، رژیم غذایی و مصرف داروها و اثرات آنها رخ می دهد، توانایی بیماران را در اجرای راهنمایی های پزشک معالج و انجام خودمراقبتی در طی روزه داری افزایش می دهد و بیمار می تواند طی ماه رمضان ایمن تر و بدون ایجاد اختلال در کنترل قندخون به انجام فرایض دینی خود بپردازد [۱۶].

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه حاکی از پایین بودن آگاهی بیماران دیابتی در زمینه دیابت و روزه داری است با توجه به اینکه آگاهی بیماران دیابتی می تواند نقش مهمی در کنترل بیماری، پیشگیری از عوارض آن و وضعیت سلامتی فرد داشته باشد باید برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش آگاهی مردم جامعه و بیماران دیابتی با آموزش های مناسب انجام شود

1-HU

2-Bruse,He,Mcppherson

References

1. Bouguerra R, Jabrane J, Maatki C, Ben Salem L, Hamzaoui J, El Kadhi A, "et al", [Ramadan fasting in type 2 diabetes mellitus], *Annales d'endocrinologie* 2006;67(1):54-9
2. Powers A, Diabetes mellitus, In: Braunwald EU, Fauci AS, Kadper DL, editors. *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 15 th ed. New York: MC Graw Hill Co; 2001: 2109-27.
3. Delavari AR, National Program for Control and Prevention of Diabetes, Tehran: Center for Disease Control 2004. 2th, p:9 [Persian].
4. Report of a World Health Organization and International Diabetes Federation meeting, Screening for Type 2 Diabetes, WHO/NMH/MNC/03.1 Original: English
5. Amini M, Mehdigoya M, Delavaei A, Tabathii A, Hagigi S, Quality of diabetic management in Iran in 2004- 2006, *Journal of Medical Council of Islamic Republic of IRAN* 2008;20-29 [Persian].
6. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, Fuller JH, Keen H, WHO Multinational Study Group, Mortality and causes of death in the WHO multinational study of vascular disease in diabetes, *Diabetologia* 2001;44 (Suppl 2):S14-S21.
7. Siitonen OI, Niskanen LK, Laakso M, Siitonen JT, Pyörälä K, Lower-Extremity Amputations in Diabetic and Nondiabetic Patients, *Diabetes Care* 1993;16:16.
8. Anonymous. From the Centre's for Disease Control and Prevention, Blindness caused by diabetes, *JAMA* 1996; 276:1865-1866.
9. Kuzuya T, Akanuma Y, Akazawa Y, Uehata T, Prevalence of chronic complications in Japanese diabetic patients, *Diabetes Research and Clinical Practice* 1994;24 Suppl:S159-S164.
10. Al-Arouj M, Assaad-Khalil S, Buse J, Fahdil I, Fahmy M, Hafez S, "et al", Recommendations for management of diabetes during Ramadan update 2010, *Diabetes Care* 2010; 33(8):1895-902.
11. Karamat MA, Syed A, Hanif W, Review of diabetes management and guidelines during Ramadan, *J R Soc Med* 2010; 103(4):139-47 [Persian].
12. Salti I, Bénard E, Detournay B, Bianchi-Biscay M, Le Brigand C, Voinet C, "et al", A Population-Based Study of Diabetes and Its Characteristics During the Fasting Month of Ramadan in 13 Countries Results of the Epidemiology of Diabetes and Ramadan 1422/2001 (EPIDIAR) study, *Diabetes Care* 2004; 27 (10) :2306-11.
13. Norris SL, Engelgau MM, Narayan KV, Effectiveness of Self-Management Training in Type 2 Diabetes A systematic review of randomized controlled trials, *Diabetes Care* 2001; 24(3):561-87.
14. Hui E, Bravis V, Hassanein M, Hanif W, Malik R, Chowdhury T, "et al", Management of people with diabetes wanting to fast during Ramadan, *BMJ* 2010; 340.
15. Uysal A, Erdo an M, Sahin G, Kamel N, Erdo an G, Clinical and metabolic effects of fasting in 41 type 2 diabetic patients during Ramadan, *Diabetes Care* 1998; 21(11):2033-4.
16. Akhoundan M, Shadman Z, Poorsoltan N, Soleymanzadeh M, Khoshniat M, Larijani B, DESIGNING A QUESTIONNAIRE TO EVALUATE DIABETIC PATIENTS' KNOWLEDGE OF RAMADAN FASTING AND ITS DETERMINANT FACTORS, *Iranian journal of Diabetes and Metabolism*; Vol.13, No 4, 2014.
17. Dunn SM, Bryson JM, Hoskins PL, Alford JB, Handelsman DJ, Turtle JR, Development of the diabetes knowledge (DKN) scales: forms DKNA, DKNB, and DKNC. *Diabetes Care* 1984; 7(1):36-41.
18. Gaborit B, Dutour O, Ronsin O, Atlan C, Darmon P, Gharsalli R, "et al", Ramadan fasting with diabetes: An interview study of inpatients' and general practitioners' attitudes in the South of France, *Diabetes Metab* 2011; 37(5):395-402.
19. Fatima J, Karoli R, Chandra A, Naqvi N, Attitudinal determinants of fasting in type 2 diabetes mellitus patients during Ramadan, *J Assoc Physicians India* 2011; 59:630-4.
20. Caballero AE. Cultural competence in diabetes mellitus care: An urgent need, *Insulin* 2007;2(2):80-91
21. Rafique G AI, White F, Knowledge, attitude and practice (KAP) survey of diabetes and its complications in people with diabetes attending a University hospital, In *Proceedings of the Second*

- Conference on DIMEMSEA:22-25 March 2000, Edited by Liaquat A Dhaka: Diabetic Association of Bangladesh & Bangladesh Endocrine Society; 2000:51-52.
22. Mansour-Ghanaei R, Joukar F, Soati F, Khanegha AG, Association between knowledge, locus of control and health belief with selfmanagement, Hb A1c level and number of attendances in type 1 diabetes mellitus patients. *Int J Clin Exp Med* 2013; 6(6):470-29.
 23. Hu J, Gruber KJ, Liu H, Zhao H, Garcia AA, Diabetes knowledge among older adults with diabetes in Beijing, China, *J Clin Nurs* 2013; 22(1-2):51-60.
 24. Bruce DG, Davis WA, Cull CA, Davis TM, Diabetes education and knowledge in patients with type 2 diabetes from the community: the Fremantle Diabetes Study, *J Diabetes Complications* 2003; 17(2):82-9.
 25. He X, Wharrad H, Diabetes knowledge and glycemic control among Chinese people with type 2 diabetes, *Int Nurs Rev* 2007; 54(3):280-7.
 26. McPherson ML, Smith SW, Powers A, Zuckerman IH, Association between diabetes patients' knowledge about medications and their blood glucose control, *Res Social Adm Pharm* 2008; 4(1):37-45.
 27. Funnell MM, Brown TL, Childs BP, Haas LB, Hoseney GM, Jensen B, "et al", National standards for diabetes self-management education, *Diabetes Care* 2009; 32(Supplement 1): S87-S94.

Knowledge of diabetic patients about fasting, referred to diabetic clinic at bojnord district-2015

Hosseini SH¹, Rajabzadeh R², Akhoundan M³, Mohaddes Hakkak HR⁴,
Tavakoli H⁴, Niyazi M⁵*

¹Faculty member at the School of Public Health, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran

²PhD Student of Epidemiology, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

³Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.

⁴Assistant Professor, Department of public Health, Health School, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran.

⁵MD, Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.

*Corresponding Author: Tehran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Email: negin124289@yahoo.com

Abstract

Background & Objectives: Fasting is an important decision for the diabetic patients, that should be done considering to the religious instructions and medical consultant. To decrease symptoms of diabetes, it is very important to estimate awareness of these patients in this domain. Aim of this study is knowledge of diabetic patients about fasting who were referred to the diabetic clinic at bojnurd district-2015

Material & Methods: This sectional study was performed on 376 diabetes patients who were referred to diabetic clinic at Bojnord district in 2015. Data were gathered using dual questionnaires. Statistical analysis was done by Pierson coordinate index statistical tests, freet and one way variance analysis using the SPSS 16.

Results: Mean age was 54.35 ± 15.83 years old and most of them were females (62.3%). Majority of cases (90.3%) were suffered from type two diabetes, and 48.3% of them were illiterate. Mean score for awareness was $35/31 \pm 11/36$. The most correct answer was related to the feeding diabetic patients at Ramadan month ($51/03 + 18/49$), and the least correct answer was in line with consumption of medicines decreasing blood sugar ($18/0 + 23/44$). In mean score based on level of education, there was only a significant difference in total score ($p=0.035$).

Conclusion: The results of this study showed that the diabetic patients have a low awareness of diabetes and fasting. Therefore, awareness of diabetic patients, can be important in controlling and prevention of its complications and person healthcare.

Keywords: awareness, diabetes